


Herniaria, Polygonum, Minus. Herba Turra, Herba
Cancri minor, Mille-grana

Turquelle, bernaire, Millegraine.




Cette plante croît dans les champs et jette plusieurs tiges —
Branchées court étendues sur le sol couchée. Ses tiges, ses branches
Sont noueuses et garnies à chacun de deux Nouuds de deux feuilles opposées,
velues; d'un vert pâle et jaunâtre, plus petite que les
feuilles du Serpolet, accompagnées de très petites (lauré à lanière)
jaunes, à ces feuilles succèdent des feuilles petites et courtes dans
leur longueur remplie de dentelle menues, ce qui lui a donné
le nom de millegraines, sa racine est courte et fibreuse;

Cette plante apprécier en Catastrophe. Surtout si l'on fait
boire en même temps le jus ou l'eau distillée queoit la
herbe d'où lui vient le nom de bernaire;

Celle est apothicairie, et tric comme pour la pierre dans la —
Bessie elle Sert aussi pour la guérison des Plaies et ulcères.
ou emploie que ces feuilles:

Turquette
herniaire
berniole
—



herniaria hispida l.

Plantago longa, *Plantago augustifolia*, *Plantago* —
qui que *steria*;

Plantain long ou à cinq nerfs;

*P*lante qui a les feuilles d'un vert noir. Elevant de terre —
chaque est garnie de cinq nerfs ou coste dans le longeur, qui est de
cinq pouces. — au bout de l'arceau, du milieu de ses feuilles, il
élevait des tiges anguleuses portant un épi court et courbue. Il
est semblable au plantain à cinq nerfs à la page 3.

C'est feuilles sont desicatives, astringentes, vulneraires
bonne pour les phlegmes et ulcères, les fêches juvéniles et l'effusion, elle est
bonne aux ulcères des genêves, en les tenant souvent du
jus des feuilles qui est très bonne pour l'inflammation des yeux;
la racine macérée apaise la douleur des dents, l'eau de cette
plante est bonne pour ceux qui crachent ou pisse le sang, ainsi
que pour les phlébitiques;

Plantain à Cinq Côtés.



10

Plantago latifolia Sinuata, Septentrionalis,
Plantago Major:
Plantain à Sept Nervs.

Partie qui passe dede Feuilles grandes large, d'un vert luisant,
ayant Sept Costes sans faire longueret couchier ses tores, il sort
d'entre ces feuilles plusieurs tiges de bois ayant dix pouces d'hauteur
couvertes de long quart de poies fleuret blancâtre -
ou pousse une, Chaque fleur est en forme d'une le poind -
évide, en bout decoupe en quatre parties; au bout de l'embrous -
tamente, lorsque la fleur est passe, il paroist un fruit
ovale protégé ou couvert, ce fruit est une loge n'abritant que
Sous le bouton une boîte à savonette, qui renferme des
Semences minces et rougeâtres, elle à la racine grosse comme le
doigt, courte et divisée en une partie de Vagueante blanche

Cette plante est Utile pour Resolutrice febrifuge, et à par -
excellence toute la Vertu des autres plantaines.

Plantain a Sept. Côtes.



Burda Pastoris, Burda pastoris Polist
Cimicifuga :

Bourde à Padieu, Tabouret :

Plant dont la racine est un pivot menu, blanc, fibreux, -
doucereux d'abord, mais peu de temps après désagréable, elle jette
plusieurs feuilles disposées en rond, - toutes sur la tige oblongue -
quelques fois entier, le plus souvent découpée. Sur ses bords plusieurs
ou minuscules profondément comme celle de la dent de lion. La tige
qui s'éleve entre ces feuilles est branche plus ou moins : assez fourche
elle n'excède pas la hauteur d'un pied, elle est blanchie, garnie de
quelques feuilles beaucoup plus petites que celle du bas. Cette tige
est en branched. C'est terminé par des épis de fleurs blanches,
composés chacun de quatre pétales, soutenus par un calice
à quatre petites feuilles verdâtre. Le fruit qui succède aux
fleurs tombe des capsules perpendiculairement en deux loges
en maniere de gouttes, et roulement dans chacune de l'une loge
quelque semence minuscule accrochée et sans pétale. ce fait a
quelque rapport à la bourse que portent à la languane les
Sorgera, et c'est d'où vient le nom de cette plante.

Le tabouret est astringent; on se lave le lèvres distillée
dans les polons atteintes pour arrêter ses pertes, celles de
la hémorragies, etc. quels que soient d'intérieur. Sa décoloration a aperçues
les ménages usages, aussi bien que son sue :

Bourcette

Bourse à pasteur.

Tabouret.



Balsamina. Balsamine).

La balsamine est une plante qui croît dans les jardins et qui donne des racines, écorces et chevrettes. Son écorce est légère brune, toute parfumée d'orange, toute rouge, rougeâtre d'une saveur verdâtre, quelquefois rougeâtre et olivâtre. Ses feuilles sont toutes rondes, à la base arrondies, à l'extrémité pointues, bordées de dents, épaisses, inégalées, à celle du pétiole, plus molles, plus luisantes, plus dentelées que les bordes, et d'un goût très amer. Ces feuilles sont toutes sur un pétiole court et étroit, porté par des pedicelles longs de deux pouces, et il y a quatre pétioles au moins dont la distance est variable; l'intervalle est assez étroit, mais non assez pour que les feuilles tombent en avant ou en arrière de celles qui sont devant. Lorsque la fleur tombe à son pétiole, la partie inférieure qui est creuse se déroule d'un coup tout entière, et il y a quelque changement dans la disposition des autres pétioles. Quand la fleur est passée, le pétiole devient un peu flas, fait en sorte, composé de pièces assemblées comme les doigts d'un coude et qui se recouvrent pour une moitié de celles qui sont devant et jointes avec imperméabilité. Ses feuilles sont toutes et toutes égales.

La balsamine qui croît dans les jardins est à fleur simple, à l'ouïe verte de rouge et de poivre, à grande fleur ou à fleur blanche, elle fleurit en juillet.

Balsamie

5



*Bryonia, Vitis alba, Fuscata,
Siliquatum, Bryonia Aspera, Sore
Alba, Vaccin rubra :*
Couleurée blanche.

Plante rampante qui s'étend sur le sol par des branchies.
Ramure, elle s'attache aux arbres et à tout ce qu'elle ramasse, par des
poignées de tendons émoublables et à cause de la vigne, laquelle
semble aussi à celle de la vigne, mais plus petite et d'un apperçue plus
gratifiante. La plante est silencieuse en grasseur de boutées —
blanchâtre et jaillit au bout d'étoile et où il suit est vinace —
composée de graines émoublables à cause de la mortelle qui en naît et fait
échouer de voir sa rouge et quelquefois en noir, (à racine),
est grande et grosse, plus que la tête d'un homme, l'épaule,
telle que que la tête d'un homme, l'épaule
jaillit par dehors et blanche par dedans, duss gout amer —
amer et ambrant avec un peu gluant et une couleur marron.

Sa racine forte, dessèche aussi et ressort, ou mange et la
remire contre le lit des rejetés, elle lâche le ventre
et recouvre l'origine et les reins.

Coulevréé



*F*los *Gyoscyanus Niger, Pet Vulgarè,*

Herba altercum :

Jusquame Noir, fève de Cochon.

Cette plante pousse plusieurs fois à la hauteur d'un pied et deux, grosse, ramueuse; Ses feuilles sont larges, grandes, molles, découpées, laniinées, blanchâtres; Ses fleurs naissent en grappe sur les branches des autres de l'arbre mêlée jaunes et pourpres. Chaque fleur est une campanule découpée ordinairement au tuy partiel. Elle n'a pas d'odeur qui ne ressemble pas mal à une maroille, et que son couvrete qui le forme assez exactement. ce qu'il est. Divisé en la longueur en deux loges qui contiennent des semences minces noires. toute la plante a une odeur désagréable:

Ce a Jusquame est assoupiante et souvent mortelle aux animaux qui en mangent ou ve l'en fait quelquefois dans son orgueil et vanité. Des empêchez qui tout bon gré ou être toutefois de douleur, les hommes Et les animaux qui en mangent de la graine deviennent comme fous, et sous l'exposition à nouveau dans la folie;

Jusquiamo.



hyoscyamus niger l.

X) angūaria, *Polygonum Latifolium*),
Polygonum Mas, *Sanguinalis prospicinaca*:
Renouée. Corrigiole:

*L*ante qui passe plusieurs lieux quelques fois de l'herbe, la plus souvent couchée à terre, longue d'un pied, ou deux pieds et demi, florile, grêle, rondelet, rebondie de plusieurs rameaux oblongues, épaisses, pointues, attachées à des queues. Son feuille sont toutes petites, composées et chaumes de luy serrinées, sont toutes par un latice comprimé en extérieur; elles n'ont pas le dessous de la feuille: lorsque la fleur est passée, il lui succede une semence à trois lobes, de couleur de chataigne, assez grosse pour la grandeur de la tête d'un gout abranchant:

Cette plante est fort volumineuse et abranchante; on la trouve dans la végétation, dans le flot humide bord, dans la crachumerie du Sang, et dans toutes les humides.

son suc rafraîchit, et resserre il fait venir et est bon aux scrofules et d'Veines:

Renouée

Herbe au cochon



Polygonum aviculare L.

(*Cardaminum, Nasturtium, Iudicum*),
Capucine, nasturtium et Iudicium:

Plante qui nous a été apportée des Indes. Sa racine est fibreuse, chevelue, rongante, oblique, grasse de quelque liquide, d'où jaillissent plusieurs tiges minces qui grimpent et se portent vers les arbres et aux plantes qui les environnent. On leur voit grise celle des Iphalanthus, rose celle des Soutanis, elles sont garnies de feuilles alternes, arrondies, d'un vert clair en dessus et lisses, plus pâles en dessous, un peu velues, et chargées de quelque sucre qui suisse de la queue, — plusieurs gouttes au centre de cette feuille, et formant autour de 2 rayons qui vont se terminer jusqu'à leur marge, lesquels sont longs de plusieurs pouces, entièrement dénudé que les tiges. — Des rares noeuds que portent les feuilles, sortent aussi des boutons qui soutiennent des fleurs composées de cinq petites fleurettes, jaunes, et ovales à leur naissance en dedans, et toutes d'abord et bientôt en cet état, et disposées dans les embranchements d'un calice d'un jaune verdâtre decouvert en cinq parties oblongues et droites, et terminées à leurs parties postérieures d'une gencive rouge, de deux tiers d'un pouce, jaune et rouge, et quelques liquides de pouvoirs quelquefois amers ou rugueux et chargés de formules de même couleur, mais sans du tout, de la fleur et environnant un pistil sur la base dont un fruit à trois semences couverte d'une eau verte et riche.

Cette plante est anti-scorbutique, elle étrangle, atire, recouvre, et incise, marchées elle appaise la douleur des dents.

On la nomme Capucine parceque la fleur a la forme d'un capuchon de moine :

Capucine.



Tropaeolum majus!

*Glycyrrhiza Siliquosa, Germanica,
Dulcis e Radice:*

Reglissoe.

Plante qui pouesse plusieurs tiges à la hauteur de deux ou quatre pieds. Ses feuilles sont oblongues, d'un vert bon, flangées, et rangées par paire le long d'une côte terminée par une pointe. Très-sucrée, son goût aigu. Ses fleurs sont Leguminosæ, purpurine, elles sont suivies de gourdes courtes, relevées, appétissantes qui renferment deux ou quatre graines, petites, rondes, dures; Ses racines sont longues, ramifiées, se branlant de tout côté dans la terre, de couleur noirâtre en dedans, jaune en dehors, son goût fort doux et agréable.

Sa racine est préparée, propre pour l'Rhume, pour la toux, pour les vices de la chair et de la Peisse.

Reglissee.



Glycyrrhiza glabra!

Ledera Cerredris Vulgaris,
Calamintu humilioris folio Rotundiore,
civis Cerredre;

() . elle est une espèce de lalement qui pousse des petites
lignes rameuses à terre, rudes, râche, les feuilles sont rondes,
d'abord nées brûlantes, un peu rudes, velues, les fleurs naissent
en Bouquet, et sont toutes en queue ou en tige decoupee pro
che bas en deux lances, de couleur bleue. Ses feuilles sont oblongues &
pointues entourées d'une fine capsule :

() Cette plante a une odeur forte, et un goût amer, elle
est forte astringente, relaxante et vulneraire : elle fait passer les urines
et le calent : elle est aussi bonne pour contenter les ulcères ; on
en fait prendre aux Stomachiques :

Lierre Terrestre



glecomia hedera ea !

Malva vulgaris Flore majore;
Folio sinuato; Malva Sativa; Malva
Silvestris folio Rotundo, omnimorbia:
Maurie).

elle présente à une racine simple, blanche, sans goût doux et flegmatique, elle possède plusieurs tiges, rondes, velues, inégalées, ramifiées, longues, d'émission assez lente et dense, les feuilles sont presque rondes, à une ou deux saillies, velues, molles, de couleur verte brune, dentelées ou lues bordées. Les fleurs sont des cloches coupées en cœurs, portées jusqu'en arrière de la base, de couleur pourpre-pâle, ou blanchâtre, mêlée de rouge, d'un parfum suave. Son fruit est aplati, en rosette ou orbiculaire, ressemblant à un petit cornet, d'un goût fade, flegmatique; il est conforme des stimulus suavis qui ont la figure d'un petit cœur.

Cette plante est fort modérée dans elle à l'égard du nom, elle a aussi un parfum doux et peu humectant, on la fait pour les asthmatiques pour les goutteux, et pour les catarractiques:

Mauve

12



Malva sylvestris !.

11

Chamomites, Sutea Vulgaris, sive
articulans

et Articulatus, Artiligus, cette herbe à
la goutte : yee Muscate :

Cette plante (raime) grosse et forte, la racine est longue et mince, elle
gouffre de tiges minces branchemens garnies de beaucoup de feuilles longues
et étroites, blanches dessous et vertes en dessus. Feuilles d'herbe du
romarin mais plus petites. Ses fleurs sont jaunes et viennent en
coupe. Couper la plante à l'âge de fin :

Cette plante est incisive, alterative, abstractive et purgative,
elle est bonne pour la goutte, les rhumatismes et toutes autres maladies
des jointures :

Arthétique : Arthritique, vette
herbe à la Goutte.



Teucrium montanum L.

Mercurialis Spicata, Sive Feminia, *Mercuriale femelle, Pignoble.*

Cette plante poussée des liges à la hauteur d'un pied, anguleuse,
rougeâtre, donne aux feuilles, les feuilles ressemblent à celle de la variété
longue tige de la plante en forme de poire. Un goût nitreux d'un pied -
pied à la sort de laissotte des feuilles, des fleurs à plusieurs
étamines. Froncture par un couteau ou hachoir feuilles cassées
en gril, qui ne sont pas d'accord fraîches :

Elle est purgatoire; on en tire la sue avec lequel on fait un
chrop qui est fort utile de soprénatif; on en fait aussi le suint
minuscule qui est fort en usage dans les fessures. Elle est
unotente propre pour la suppression des mord, de pour les pâles
couleur :

Mercuriale Femelle



Mercurialis annua L. ind. mala

Mercurialis Testiculata, Sive Malo
Mercuriale Môle, Pignoble ou Vignette:

Plante qui pousse des bûches à la hauteur d'au moins un pied, -
Ampoules roulées, toutes au souche. Ses feuilles ressemblent à la
gratiante, mais elles sont assez droites en leur bord, vertes,
un peu blanches, je n'en ai pas assez de temps pour décrire, a
charme quelque peu décoloré par le soleil, un peu appétissant
à l'odeur, lorsque cuite ne ressemble point au romarin ou à l'origan. Le
fruit est une bûche de fruit à deux capsules, un peu sucrée et
fumée par la racine et la tige qui ne
s'assèche pas, sa racine est tendre et fibreuse;

Elle a les mêmes qualités et l'usage que la mucorale
- ouelle.

Mercuriale mâle



Mercurialis annua L. m̄s. femelle

Viola Tricolor Houtensis; Herba Trifolia,
fæcea,
Lindée, Herbe de la Trinité.

Cette plante est une espèce de Violette qui à la tige mince, à
triangulaires, réciproques, ramifiées, les feuilles sont lancol rondeles,
comme celles du Linier forestier, lancol oblongues, dentelées alternées.
il a des aisselles des feuilles de longs pédicelles qui soutiennent
de belles fleurs. Composées de cinq feuilles nées de l'œil toutes
différentes, blanches, pourpres ou blanche et jaune, sans odeur, il
laisse la racine des coquilles qui contiennent son semeur mince, laissant
la racine est débâtie et fibreuse.

Ses fleurs sont bonnes pour l'épilepsie et pour les
maladies du poumon.

Pensée, herbe de la
Trinité



Viola tricolor L.

Cedra Arborum:

Pinus:

Le pin qui croît tantôt en arbre, et tantôt en arbuste, est donc
une plante vivante, éteinte. Ceux qui se trouvent sur sols humides
sont rebroussoisés et sans racines. Si cependant dans les plaines des
Alpes ou des Pyrénées, de profonde racines : son écorce est râpeuse et
jaunâtre, son bois est dure et blanche, ses feuilles sont grandes, larges,
moltées, rugueuses. Jusqu'à certaine lout le long de l'arbre, lissantes,
et l'arbre dont l'écorce chame de longs huit radis, de l'arbre
frêcheur ; elles sont lisses de bas en haut, grosses comme celle du
pinier. Ses racines se trouvent de toutes sortes quand elles sont
mûres ; elles entourent l'arbre, l'assassent accoudé. L'arbre dont
est cette sorte n'a pas de racines, mollesse.

Les feuilles et les baies de l'arbre sont vulneraires
et détersives ; on appelle les feuilles, l'arbre, pour la
moudre de l'arbre :

Lierre



heder helia l.

Scordium Irisago L'illustris.

Gernandreeij D'au:

Cette plante a la racine longue, fibreuse et rugueuse,
elle pousse plusieurs et leys et haute d'en deuy pied, les feuilles sont et velues,
garnies de petites pointes opposées deux a deux, l'entoloie est decouperé apeu
petit comme celle du Chêne, l'irise dessus et pale en dehoux forme et
un peu velue. Son gout amer acer et aromatique. Ses fleurs sont
des assettes de feuilles et sont en goutte purpurine et de couer deux,
au lieu de l'ire supérieure elle ont une petite pointe ou dentelle,
abso lâche et long et croyz il n'en ferme quatre petites semences.

Cette plante n'est pas diaphoretique elle entre dans la
herboristerie;

Germandrée d'eau



Teucrium scordium L.

Milium Semine Lutes, Sed albo.

Mil. Millet:

Sainte qui pousse des tiges a la hauette d'une poude et Denier) assise grosse, rameuse, Sed pétillant. Son semblable à celle du Roseau, large de place d'un pouce, et plus. Ses fleurs naissent sur) telle ou en bouquet au bout de ses tiges, et ce sont composées) d'chaumes de plusieurs étamines, qui sortent du milieu du calice,) le plus souvent a deux, jaunes, et l'avoine Suede, et graine presque) ronde, et ovale, et brune, luisante, et de couleur jaune ou blanche)

La graine est employée auquelque endroit a force du pain,) qui est le plus facile, et de petite importance, mais qui est le plus, à assise bon goût. On connaît des oiseaux de cette graine, et les) oiseaux en leur force grande, on les fait en médecine de la partie) de la trame du diabète pour faire que n'importe quelles coups et) rebouffis.

Mil.

Millet



Panicum miliaceum L.



Amarante oïdes.

Eternelle de sainme



* *Gomphrena globosa L.*

Marrubium album Vulgare).

Marrub. Blane).

Celle plante a une racine ligneuse, simple, ébranlée, lisse,
Généralement plusieurs branche, dénudée au pied, ou davantage,
couvertes de laines, lisses, ramifiées, etc., feuilles tout opposées
l'une à l'autre, presque rondes, rondies, dentelées en bordure,
glanduleuses, etc. fleurs sont petites, blanches, rougeâtres, pas étiquetées
et comme par conséquent le nom des types change d'heure et pour l'ayant
découvert dans le haut en deux levres, lorsqu'elles sont passées, etc.
leur sucre qu'il renferme oblongues, toutes ensemble.

Toute cette plante rend une odeur forte, crue et liquide, elle
est propre pour la faire pour l'asthme, pour la phthisie : on fait
petitement dans la fournaise, et dans les oblateaux du pays de
la cassie :

Marrube Blanc



Marrubium vulgare L.

Cypus Salicarius, Sise Pinnulus,
- Cypulus: Poublon.

Plante qui a les tiges courtes, larmoyantes, striées, rudes, velues, qui sentent la sauge des arbres, et de ce quelle ressemble; les feuilles sont larges, tombables à celle de la Coulée, mais d'un bord plus court, rudes, sentent attaqué ces arômes l'âme de l'arbre. Ses tiges par des gouttes assez longues, rougeâtres, échappent au toucher, les pieds pendent en forme de grappe, petites, blanches, ou pâles, elles sont composées d'une multitude d'écailles qui naissent sur une ligne d'inégale forme de griffes disposées en Rosace. Les pieds naissent sur des pieds différents de ceux des Stewart. Ce sont des tiges ordinaires aux branches, composées de plusieurs feuilles en écaille. De celles-ci toutes blanchâtres sont sur le sommet d'une sorte forte, sentent la sauge grise; elles contiennent une semence presque ronde, noireâtre, enveloppée dans une coiffe membraneuse, soit râpée soit moulue. Sentent aussi le sauge avec les autres.

On fait cette plante sous le Stewart et le Saule noir. Dans la composition de la bière, on mange les premières boutons comme les asperges, ou se sent ses tendres et des tiges de poublon pour servir le Saug sous le Saule, dans les borts et sous toutes les sautes de la plaine, ou préparer des fumets des apéritifs avec le poublon, pour l'apéritif hydroconductrique, pour la indigestion, et pour provoquer les ordinaires.

houblon



humulus lupulus L.

Atriplex Portensis, Alba. Sive Pallide

Virens:

Croche des Jardins, Potelle. Bonne Dame.



Sainte Solagine, sa racine est longue de trois a quatorze pouces,
droite, fibreuse, et annuelle. Elle possède des feuilles coriacees, chargées
d'une poussière blanche, aussi bien que le jeune tige qui présente
à la hauteur de cinq a six pieds plusieurs de feuilles alternes, un peu
charnues, anguleuses, sudées, et un peu frisées sur leurs bords, toutefois
vertes le plus souvent d'un vert pâle. Ses feuilles, et quelquefois
l'ancien de pourpre, ses branches et ses tiges sont terminées par des
gras de fleurs composées de plusieurs lanières jaunes ou verdâtres.
A ses fleurs suivent soit fructs longs sort de deux feuilles coriacees
de la figure d'une saucille, serrées, roulées, et qui renferment
une petite semence.

ses feuilles sont rafraîchissantes, enflammées, et donnent au
bouillon une belle couleur s'ostent pris en plus grande quantité elles
tâchent le ventre; ou les mal greus. cette raison fait les dévotions
pour les Layettes. Ses semences, grangées, peu hant et gras car, l'arroche
et emmène de l'estomac. Sa racine est bonne contre l'gauchement
des jambes, l'opilation de foie. comme elle provoque a vomis, il ne
peut la donner qu aux gens robustes, l'herbe, assainit l'urine que
l'on appliquez contre les froustes et toutes les douleurs, et fait
tourbo les ongles gâté etc.

Arroche des Jardins. Folette



Arroche des Jardins.

Caryophyllus sinensis : *Vellet de la Chine :*

Plante dont les racines sont rurieles, et produisent des tiges
minces, noueuses, - Et l'ail est longue et étroite comme celles des
cœllets ordinaires - plus minces et plus tendres que les noues des tiges
et sort des pieds semblables aux premières et beaucoup plus
petites, au sommet des tiges qui se dressent en grappes. Chaque
chasse est chargée d'un bout rougeoé. Le Cuir présente de jolies
couleurs foncees, bordées d'un petit ruban blanc et divisée transversalement
d'une ligne noire étroite et lisse par une latice divisée en Cuiry -
partie des tiges, au bout duquel est un pétale que je divise
en deux qui sont : la tige devant pour tout comme un poirier et
l'autre vers l'ouest aussi longue sous des grappes rouges et
brunies -

Oeillet de la Chine



Dianthus chinensis L.


(gernum c. Robertianum Alterum, Herba
(Roberti):

Hee de grue, ou de ligogne, Barbe Robert,

Lezard - Sois commun à la lamproie, et comme est mordue
l'indole. Soit décapité et statueront alternativement à nos grandeurs
telle et telle en quelque façon à celles de la griseuraille, mais plus
petites et plus petites. Soit toutes et toutes, toutes nos tiges
d'indole tenu à quatre points, portant en leur éminence des fleurs
gousses à leurs extrémités. Soit toutes. La griseurie telle et telle décolorée,
le gout d'elles quelle inviter le bœuf à me griser ?

Cette partie est volumineuse et y ne correspond pas; elle contient la
partie de l'ouvrage où l'on démontre que les idées sont universelles. Elle
est composée de deux parties: une partie théorique, et une autre pratique. La
partie théorique est celle qui démontre que les idées sont universelles.

Bee de Grive, Bee de Cigogne
Aigrette de Berger



Cicuta virescens L.

Geranium folio Malvae . Rotundo.

Bee de Grue à Feuille de Mauve.

Plante basse presque compoſte, Ses racines sont menues
blanchâtre, Ses feuilles velues, arrondies, semiobtuses à cœurs, la
mauve plus petite et decomposée en plusieurs lobes attachees le long
de che branches, Ses tiges sont branched et pourvues de pedicelles
qui sortent de l'angle des feuilles et a l'extrémité de ces branches
quelques pétioles qui soutiennent de petites fleurs purpurine au
nombre de deux sur le mince pétiole, et auxquelles succèdent de petits
petits oblongs, en maniere de bee de grue :

Cette plante a les mêmes qualités que celles precedentes -
page 25.



Bee de Grise
herbe Robert

Geranium rotundifolium L.
Bee de Grise

Sonchus Leric Angustifoliis, Sonchus
planus
(Sonchus Leric Lactiferus latifoliis)
(Leteron, L'acron, Bresseron, palais de Lierre).

(^Oette plante à une petite racine) - Abreus, Blanche, la tige croît
à la hauteur d'un pied et demi, ronde en dedans, tasse de pouleau-
poumee; ses feuilles sont longues, lisses dénudées lorsque celles
de la tige de Lyon, dont elles sont égales alternativement, les fleurs
naissent au sommet. Ses feuilles sont toutes à son extrémité formant
plus grande que celle de la tige de Lyon. Ses feuilles sont toutes
grosses, très lâches devant un fruit qui contient des graines —
fumées oblongues, grises, brunes ou vertes.

Cette plante roulé en S. Leteron: elle est bonne à manger, —
elle est balsamique, rafraîchissante, apertive, etc. Ses feuilles pour-
voir inflammable de foie, de la poitrine et pour nettoyer le Sang.

Laiteron, Liaceron,
Palais de Lievte



Sonchus arvensis L.

*Satureia Sativa, Satureia Portinaria,
Sire Canina Sativa, Satureia altera,
(Sarielle, Sarouree):*

Plante qui pousse de petite voegue à la hauteur d'un pied et davantage
à bout des feuilles sont presque oblongues, semblables à celles de l'absinthe
peuvent de beaucoup de brise, mais qui ne traversent pas d'une étoile —
approchante de celle du thym, d'un goût répugnant. Ses fleurs sont rugueuses
tout-à-fait. Similable à celle du thym, mais aussi dans les racines
des feuilles de Couleur blanche tâtant sur le parapet, il leur saveur
des seneurs presque sonder et meurie, la racine en est sucree —
légumineuse :

Elle est propre pour la Soifesse, destomme, pour l'asthme pour
la suppression des mœurs; on l'emploie souvent dans les saucers.

Sarielle



Satureja hortensis L.

D *E* *C* *o* *g* *o* *r* *a* *n* *a* *V* *u* *l* *g* *a* *r* *i* *s*, *S* *i* *v* *e* *S* *u* *m* *p* *s* *u* *c* *h* *a* *m*)
Q *u* *m* *a* *c* *u* *s* *S* *u* *m* *p* *s* *u* *h* *u* *d*).
Mariolaine

Cette plante qui est ordinairement branche fine pried, et grossie
plusieurs branches liguées, le plus souvent dans un peu velles
longuettes ou saules. Son rameau vicarier tenu de l'atze, —
semblable à celle des origan, mais beaucoup plus petites, molles
blanchâtres d'une autre sorte, aromatique, et une gout acre et forte,
peu amer. Ses fleurs sont en forme de pomme, rousseâtre, oy
marquée d'épines ou de cédre plus nombre et plus courtes que celle
de l'origan, composées de quatre feuilles portées par cailler.
Les feuilles sont petites et en queue, chacune d'elle en un curiu
bouquet, partie haut en deux lobes de couleur blanche. Ses
sauvage sont moins, presque toutes de couleur rouge, odorantes
douce.

Elle est bonne pour les malades de la soie et de la poitrine;
elle fortifie le foie; on en suéde dans les grosses stomacées, dans
les crétins, dans les fievres.

Marjolaine



Origanum humile L. Scop.

Buglossum angustifolium Majol,
Buglossum vulgare :

Buglose commune Langue de Boeuf:

Plante qui vivit ordinairement dans les bordures et dans les
bordures des chemins, la racine est griseâtre, longue, brancheuse, rondelette en section,
branches coudées, et flétrissante au point. Il ne pousse plusieurs pieds.
Longeur environ 60 cm, terminée en pointe. Racine et feuilles de l'extrémité du Nord courbées
également, et formant sorte de poche qui la rend - uide. De deux nœuds
plus ou moins plusieurs rameaux sortis, redressés, dressés ou curvés,
rouges grisâtres de toute la partie convexe, avec toutes leurs longueurs
d'un gros bout et riche, brancheuses à l'extrémité, et garnies de
feuilles semblables à celles du bas mais plus courtes, de l'assise
desquelles partent les branches. Ces feuilles naissent aux extrémités
des tiges et des branches, elles sont les plus courtes. Bleues, plus
rarement blanches, ou de couleurs inégales. Chaque fleur est une
campanule à pavillon occupant le plus souvent en angle droit obtuse.
Cette fleur est solitaire, presque toujours verte qu'à peine en ulyssiponais qui se confondent
avec leur fond quatre semaines. Semblable à la tête d'un Viper :

La fleur est du nombre de celle qui me nomma Cordiale. On
dit que cette fleur dans les Bourguignons rappelle la forme et la couleur
de la langue et la transpiration :

Buglose, Langue de Boeuf



Borago officinalis
Non acris

Heliotropium Majus.

Heliotrope Tournesol.

Plante qui a environ un pied d'hauteur; elle est branchue, et blanchâtre, ou plâtre grisâtre, garnie de feuilles en éventail oblongues, et un peu velouté, de mûres lourdes que la tige va charriées; Ses fleurs qui sont à double rang, disposées sur une pente assez inclinée vers l'ouest échancrée, sont dans toutes sortes de nuances. Je vois. Bassin pleine en étoile blanche et un peu rouge, Le calice qui est lourd est enveloppé par l'ovaire en cinq parties de même desquelles l'étoile au pistil qui enfile la tige et qui est garnie à la base de quatre feuilles et minces, courbées sur l'axe et grisâtres.

Cette plante est répandue, et propre à arroter les vases et arbustes. Ses feuilles tombent lorsqu'elles sont vieilles, et amorce le deuxième vert.

heliotrope herbe aux Verrues



Heliotropium Europaeum.

Scabiosa hortensis, Scabiosa major
Scabiosa Major (Guamatis Capitata),
Scabieuse, Fleur de Veuse.

Plante qui pousse de la racine des suillies longues parçons, delices
d'entre lesquelles il rebrousse son tige à la hauteur de deux ou trois
pieds rebrousse de quelques pieds plus petite que les précédentes
forte duvouvee. Feuilles luisantes et collantes de la grande Véronique. Ces
feuilles continuent en faire un peu de l'herbe rase. Feuilles disposées en bouquets
comme le bouquet de l'herbe rouge de l'autre Véronique. Gramoïde,
minuscule. Lorsque ces feuilles ont passé la fine herbe des
maisons se tètes verdâtres. Ampleur de la partie qui continue
charme une jument oblongue surmontée d'une coquille, à racine
en droite longue.

Cette plante est sibotique, maluiceuse, répugne pour l'arthrose
mais la petite racine ou l'herbe avec le jus exprimé de
toute la plante bue est très bon pour les maladies de la gencive.

Scabieuse. Fleur de Veuve




Scabiosa atropurpurea L.

Enaphyllum album, quinque folium, album
majus alterum, vel respend.

Quinter-faüille :

Plante qui pousse des tiges. Son sujet est grêle, velouté, flexible;
ses feuilles sont oblongues, croisées en lund bords, velouté, unguiculées ou
mais coriace, d'ayant la mout queue. Ses tiges sont courbées de long
parties feuillées jumelées, des podes en arceau. Son sujet pousse au bout de
longs d'arceau et de tiges, d'ayant grandi, et l'autre pétale renversé
alternativement. Son fruit est composé de plusieurs branchelettes
ou minuscules de tête développées pour le culte. La racine est grosse -
comme la poire verte, rouge noirâtre en dehors, rouge vif dans -
l'intérieur astriugent.

Cette plante est utilisée ce astriugente, ou employez sa racine
fort utilement pour les décolorations astriugentes, pour le tacheur de
laine et pour toutes sortes d'herborisations. On assure que un gros de
sa racine de la même racine, prend l'autre au voisinage de la racine
l'autre des fentes et éventrées.



Quintefeuille

Potentilla secunda l.
farinacea

Trlica, Vens Maxima).

Ortie commune, ou grande ortie) :

Cette plante passe des tiges jusqu'à la hauteur de trois pieds, carrié une feuille opposée sur deux, lancé à leur basse pointe sans pétiole, dont elle se trouve couverte de deux poils courts et frangés. Ses fleurs naissent dans l'axe de la feuille, formant comme de petites grappes. Chaque fleur a plusieurs étamines, toutes par un filtre à quatre feuilles. Ses feuilles sont petites, ovales, oblongues et courtement pourvues d'épines (cinq ou six) formées par deux feuilles.

Cette plante est diurétique, pouvant établir le mouvement des liquides, soulager le douleur de la vessie et le flux des semences, pour le calcul et pour la gravelle du foie. De la racine s'agit au moins de l'herbe.

Elle convient avec le microscope pour l'écriture de petits textes, dont la base est une petite case qui renferme une ligne unique, qui recouvre par un filtre au moins de cette plante à pointe, et qui écrit. De la racine d'autre part la partie piquante :

Grande Ortie



Urtica dioica L.

Senecio Minor Vulgarie).
Seneçon, ou Chénossois).

Plant qui pousse une ou plusieurs tiges à la hauteur d'un mètre
ou plus, rondes, lisses, avec peu de feuilles - simple, ramifié alternativement
avec des feuilles lancéolées, sessiles, et dentées. Le terminal est en une
grande obtuse. Le feuille verte obscure. Le fond n'a pas de sommet.
Les feuilles et les branches, chaume d'olive est à boutons aplatis
jaunes en forme de graine. Il a une racine blanche. Il lui manque
une graine jaune dure. Sa racine, et graine sont aplatis.

M. L'apporte cette plante sous le nom ordinaire de Seneçon
et que l'on distingue que l'on ordonne sous ce nom la "l'hygrophore".
Il n'y a pas de nom à ce nom, et appelle "à l'olive".

Sennesson



Senecio melares.

Solanum officinarum acinic Nigrantibus
fuscis, *Solanum Bacciferum officinarum*.

Florille.

Cette plante a la racine longue d'environ cinq pieds, endoyante, blanche-Sale
blanche et chevrelue. La tige qui est pleine de moelle, flèche à la
pointe d'environ un pied et demi, verdâtre, après la floraison, divisée
en plusieurs branches, garnies de feuilles alternes, oblongues, pointues
obscure verdâtre, les sèches luisantes. Les fleurs sont toutes des
branched minces, au peu au dessous des feuilles elles naissent depuis
cinq jusqu'à huit ou neuf bouquets. On dira pour ce deux. Chaque
fleur est blanche d'une. Toute feuille longue en dessin, divisée en
cinq parties jusqu'à vers la cavité, longue et pointue et ramifiée
en étoile, lorsque la fleur est présente il n'y a pas de fruit sphérique
assez dur, verd d'olive d'abord, puis noir, gris ou bleu quand
l'impude et se plisse une par une.

Elle est propre pour materer l'infestation muscarum folis
et pour relâcher l'id fibre et que dans une telle infestation, on
applique l'herbe sur les boutons blemirapide. On la fait fort pour
l'infestation, les orties le feu rotager et les boutons.

Morelle



Solanum nigrum var. aculeatum!

*Cardus Fullonum cypriacum sanguiniferum, labrum
veneris:*

Chardon à Carder n'a pas de filon, a Bonnefier

Plante dont la racine est ronde, blanchâtre chargée de
quelque grosses fibres et qui donne une huile longue d'un pincé
et doux et dont la racine griseuse n'a pas de lange. Vendue, vendue, ma
plus-value. Sciatoleste. Ses feuilles bordées rebondissent. N'une grande
côte spinuleuse et pointe étendue que j'udi le Dr. Souillet. de Cognac; ja
sais fort toute de la nature racine et l'herbe à la branche. Segments
de 15 et même 20 cm. de long avec quelques folioles grosses comme la voie
tronc canalis et spinuleuses, arrondies. Semences assez grosses, et distinctement
pointées. Les feuilles sont toutes petites au bout de la tige que l'on appelle.
ces feuilles se terminent en pointe et sont plus petites, et plus
étroites que celles du bas, mais ont les premières plus épaisses. La
feuille distillée sortent des branches supérieures et divisées en deux
autres branches, qui portent à leur extrémité en pointe une tige
longue de deux à trois pouces qu'on a dans la tige, composée de plusieurs
petites graines et terminée par un pétale. Lequel pétale forme comme
un abricot sur la tige qui sortent l'entrelacé et qui sont
généralement laves de graine; recouvert en leur
bords en partie segment. Alors sortent des feuilles embrayées
qui serviront aux autres personnes. Abriques, baubier, et à quatre
pieds.

Cette plante est aussi dividée et branchée pour parquer et faire des liserons ou rampes :

Chardon. a Carder



37. 1. 16. 7. autumn 2.

Oriplex Silvestris.

roche Sauvage:

Cette plante ressemble à la roche des jardins fol. 23. -
Sont les feuilles en plus bruyante. Les feuilles plus petites, sont
toujours plus serrées et compactes, etc., rameaux à l'air froids. Feuilles
plus vertes :

Celle-ci n'a pas même qualité que celle des jardins.

Arroche Sauvage



Arroche Sauvage

Eupatorium cannabinum.

Cupatoire:

Elle présente plusieurs sortes de racines : une est virace, chargée de beaucoup de fibres blanchâtres; la seconde est toute huileuse et forte quatre pieds, brancheée d'écoules roulées dans un état de morte; les feuilles sont longues comme celles du charrue et toutes droites et dressées. Ses deux bouts opposés se divisent en deux ou trois branches (qui sont toutes égales). Ses feuilles sont rapprochées au pourtour, elles sont composées de lames. La racine est peu de poupe, toutefois grossièrement chargée dans sa partie et renflée dans sa partie allongée, grise et maigre.

On dit que la racine est parfumée qu'elle soit romaine, toutes les parties sont bonnes pour la lacheté; particulièrement la partie grossière qui est salutaire.

Eupatoire



Eupatorium cannabinum

Amarantus.

Amarante, or amaranthe.

*S*ainte que croit a la bontee d'au pere et Dieuy, tel fleur, fons
oblaupart, gourment vole des bouteill' bouteill', un royaume bras, tel
fond bras belles. bouteill' bouteill' ne, fri ou framboise, bouteill' framboise
rei ou jaune fraise et quelquant joli blanchot interprete en igne. auer
la plus grue des sprees d'autre bouteill' en n'recale, ou au creste de cog
chapeau, bouteill' bouteill' de galabuch, et bouteill' de potier. Neuron
autour du pectil qui revient une vigne, minoubranche, reionde qui
touve bouteill' bouteill' en bouteill' en que-sapuis quelquant. bouteill'
minet bouteill' bouteill' blanchot bouteill' bouteill' bouteill' et galabuch bouteill'
noire :

Amarante. Passe Velours



Belina

Cataria major vulgaris.
Cataire herbe aux Châles :

Plante qui jette une tige quarrée hérissée de trous à quatre
grands, branchede, et garnie de feuilles dont la figure aperçue
de celle de la mélisse, mais plus étroite, d'une odour délicate.
Elle sort brusquement et velours que la tige, et les branches
qui portent à leur extrémité des tas de fleurs rameuses en
grappe. Ces fleurs sont brusquement divisées en deux lobes
dont l'antérieure est ouverte en cuillère, et ces fleurs succèdent
quand l'ensemble renferme sur le fond du calice de la fleur.

Cette plante est aperçue et propre à provoquer les ordinaires
et divers vapours il faut son service à la manière de l'herbe à la
faire infuso dans du vin :

Cataire, herbe aux Chats



Nepeta cataria L.

Mentha Rotundifolia Cispa,
Menthae orbicularis, Mentha Sativa :

Menthe Sauvage, ou aquatique :

Cette plante pousse des lieux à la hauteur d'une coude, carree, velue, ferme, tout presque ronde et ronde, le feuille son en greater petitet rougeâtre ou rose à l'epi d'un rouge pâle, la racine est en partie noire la racine n'est pas croquante et fibreuse, toute la plante a une odeur forte et aromatique aussi agréable que la Menthe Labiate, son goût est amer, avec astreignant.

Cette plante est employée dans la fièvre et dans l'asténie de l'estomac, dans le vomissement dans le rhume, dans la colique, ou l'application sur les mamelles de femme pour diffuser le lait qui s'est taillé.



Menthe aquatique

Mentha rotundifolia L.

Malva silvestris, *Bismalva altera*,
Ibisus ou Biscut.
Guimauve)

Cette plante a plusieurs racines, hirsutes, grosses comme le pouce, blanche en dedans succulentes. Ses tiges sont hautes d'environ trois pieds, velues, creuses. Ses feuilles sont au milieu, bulbeuses alternées, toutes rondes. Sont sur la pointe, blanchâtres, comme une gencive, râpées, la fleur pour faire un rosié appelleant comme celle de la mauve ordinaire plus petite et couverte de chair,

Elle est bien connue l'usage en médecine, elle est très adoucissante et très emolliente, propriez pour la maladie des reins, de la vessie, pour la douceur des veines et la propreté grosses et ardentes d'urine, et pour la lithique urétrique.

Guimauve



Althaea officinalis !

Argentina. Potentilla. Andina herba. ! Argentine, Potentille, Herbe aux Oies

Cette plante a ~~la racine~~ une racine mince, brune extérieurement, quelquefois
fibreuse, branche et ascendante au goût, elle donne plusieurs feuilles
disparues jusqu'à la Côte du plus jeune, l'ensemble long, étroit,
profondément dentelé, entre celle-ci tout plaisir de plus petites,
arrondies et crenées. Ses bord, ou plus longement, ou feuilles
à celles de l'auantaine, elles sont rugueuses, plus molles et argentées sur
leur côté, il se trouve des poils dont les feuilles sont un peu gris.
Les feuilles qui sortent de la racine s'abordent ça et là et prennent
toute comme les Drueches ou Saurier. On appelle ces feuilles Sœurs
ou frêche de plus. Sœurs, ou, Voilà, grise, long de bras ou quelques-
unes, et qui porte à son extrémité une fleur grise à 5 pétales,
fond noir, graine blanche, d'oeuf ou d'igname. La plante
apprécie que les potes de la fleur soit tombée, soit déroulée, et
un anat. de sa couleur marron noir en tête,

Il est intéressant de la faire pousser pour apprécier les mauvaises
de bœuf. Son eau distillée est merveilleuse pour faire guérir les
roustissons de Vénus et grossir les crevasses, et ses graines ont trop
bonne force le flux de sang et les coups de ventre :

Argentine
herbe aux Oies



Potentilla anserina L.

Blattaria Lutea folio longo Sacriato.

Blattaire, herbe aux Mites:

elle plant a quelque rapprochement avec le Bouillon blanc, sed - la tige
longue et étroite, plus forte, dressée, et dépassant les deux bros, plus
recte; les tiges sont hautes de trois a quatre pieds, brancheées, dressées
garnies avec le bas de quelques feuilles, plus courtes que celles
supérieures, ces feuilles qui accompagnent le haut de la tige et des
branches, sont d'une seule paille, sans tige en rosette, dont les
angus quartiers sont obtus et arrondis; des parois de ces fleurs qui
ont une odeur douce, peuvent faire l'huile préparée a force
fumée: ce pétale qui compose le feu devient une huile amère
et qui souffre au feu. elle contient de l'acide malique et angustifolia



Blattaire, herbe
aux Mille

Verbasca - n. blattaria L.

*C*onsidérations vues, Seu. *Hydrospiper.*
Curage, Lessicacie, Poiree aquatique.

L'ante d'un gout amer, et mordant, qui prouesse des tiges a la
fame d'un pied creusee, nouree, des feuilles sont semblables a celle du
peste. Ses fleurs sont disposées en grappe, de couleurs ordinaires (purpurne)
et quelque foie blanche. Chaque fleur a uny, cornu, soutenu par
un calice (indù jusqua la bas) et quatorze ou cinq parties, lors que
les fleurs sont possies il leur succede des tiges dont ovale appartenant
prolonger, nouree celles, les rameaux sont fibres.

Curage poivre aquatique.

Persicaire.



Polygonum hydropiper L.

Marrubium Nigrum, Siliquum balloté.
Marrube Noir, ou Saut :

cette plante pouue sur lequel a la hauteur d'un pied et deux, ou de deux pieds, l'arbre, velue, rican - au le rouge, les feuilles sont opposées sur la tige le long des tiges - sembleront a celles de la mélisse, mais plus rondes et plus minces, velues, avec une goutte de floue sous cette partie, le bout rouge, chaume d'entre est rouge au rouge que le huit ou dix centimètres, lorsqu'elles sont passées il n'en reste quatre ou cinq au peu longues.

Sa sucretion est excellente dans la grippe hystérique et dans l'asthme hystérique.

Marrube noir



Marrubium nigra!

111. II

Tilbymalur, helioscopique
Cithrinâle suivant le Soleil :

Cette plante grossit des Scutellæ Schubertianæ à celle de la pomme,
du moins je les j'assure il leur est égale, au nombre de quatre ou
cinq de la hauteur de cinq à six pouces, garnies de Scutellæ abondantes
chaque tige portant de 12 à 15 à la graine blanchâtre, portant
de chaque une Scutelle plus longue que les autres, ces bractées
à la longueur de deux pouces, en prenant sur trois ou quatre autres
à l'extrémité desquelles sont quelques autres petites bractées
soutenant des fleurs d'un vert jaune, lesquelles produisent
des Capsules contenant des graines blanches toutes d'un tout
finissant en pointe, et très sucre : toutes sa plante en laissée

Cette plante est corrosif, on l'emploie pour les lèvres aux
pieds, les poisons et les dattiers ;

48

Tithimale helioscopius



Euphorbia helioscopia

Cithimia laevis; *Lactuca marina*,
Sive Caprina

Tubinate - Marin

(Cette plante possède la racine plusieurs fois épaissie, les feuilles sont en pouce) de longue forme étroite droite ou quasiment : branches de la tige toutes de 1 à 2 pouces et plus courtes sont munies de petites feuilles très minces : cela longueur d'une tige est grande, à l'extrémité deux branches il se forme quatre ou cinq bouquets de racines épaisses, lesquelles s'écartent tout près de la tige : une tige jeune :

Cette plante à très minces qualités que le Cithymia sudan Lefort, elle est parallèlement bordée.

Tithimale

Parolius



Euphorbia paralias f.

(*Belidonium*, Maisse, vel *Chelidonia*)
(Grande Chelidoine).

Cette plante à la racine grosse comme le petit doigt, fibreuse, rougeâtre en dehors, et d'un jaune de safran en dedans. Elle porte des feuilles plusieurs fois plus longues que les moins de son pied, velues, sur le dos grises et déboussolées profondément en nervation lâche. Feuille au manche très long, rampant, - comme dans les feuilles, cinq paires de nervures par un segment couronnant plus large que les autres. Chaque segment ressemble à la feuille de l'âne et est entièrement nisée. Sur les bords en outre une ligne qui s'élevant tout le long de la feuille, en griffes, divisée en quelques branches, chargée de quelques poils assez finisables à celle du bas et sous l'ombrage par les Bouquins de fleur sur les pieds. Commune - sortant du côté opposé des branches de la ligne, lesquelles branchent l'extrémité des aisselles des feuilles, et tournent le sommet contre la structure des feuilles à quatre parties. Toute cette partie laisse à deux pétioles, feuilles qui tombent au même temps que les fleurs se séparent. Des feuilles à feuilles nubiles et de la même couleur. Les pétioles portent un poil qui sortant entourent une ligne droite de deux pouces et demi de l'œil de la feuille toutes deux appuyées à deux bords d'un châssis à force; c'est à dire où l'œil n'est couvert d'autre membrane, comme dans presque toutes les autres Plantes, aux deux côtés de ce châssis sont attachées à des lanières noires, longuettes, noires, et luisantes sur leur moitié, contre lesquelles donne un fil jaune et noir.

Cette plante est très aperçue, elle est connue à ceux qui ont des doigts presque entièrement en aplatisse, ou employés l'externelement en frénérature, pour l'en faire aussi gaigner malade des yeux et transformer l'avareté de son œil avec du lait?

50.

Grande Chelidoine. Eclaire



Chelidonium majus L.

Balap Officinarum Pudarugoso.
Celle de Nuit ou Merveille du Perou.

Plante qui croît naturellement aux Perou et que l'on cultive en Europe & cest plant à la racine grosse comme le bras d'un pied. Voire plusieurs et grande au dessus de personnes de mède, elle pousse des tiges & rameaux faibles l'ouverture des pieds garnies de feuilles opposées toutes larges à leur base pointue à l'arrondi, branche l'axe vers un peu grise et concavée, la plante est un tuyau ovale sur l'extremoit à poivillon de couleur de violette l'arête quelque peu varie et tenueté de silice elle épanouit la nuit et se referme au matin dans le rayon du soleil. Il y a tout pourrit le feu, au tige est est de couleur elle est tout brune lorsque cette plante est rassée il y a une partie qui tourne dans la partie une tenueté presque ronde voire à la grosseur d'un poing.

La racine est rugueuse et suintement bonnes pour les montez et les hidropisiers.

Belle de nuit. Jalap



Nicotiana Salazari

Ortica, vrins Minor.

petite Ortie ou ortie Gruebres:

elle pousse vers la hauteur d'un pied ou environ, les rameaux
ont quelques feuilles au sommet, portant des feuilles en bandes bordées
quasi de petite ortie, ces feuilles sont plus courtes que celles de la gruebre; il
y a dans chaque bouton une autre sorte de feuilles plus étroites
branches garnies de feuilles parallèles à celle de la gruebre, A
part de celles de la gruebre, il y a aussi quelques feuilles d'au moins 3
plaques fleur à l'extrémité, mesurant environ la hauteur d'une
feuille, il y a sur cette fleur de cette branche que l'on appelle la gruebre
des boutons, le mûr qui porte la graine, qui est grosse et ovale.

cette plante est aussi forte et a les mêmes qualités
que la grande ou la folle, et comme contre le venin de
la cigale abat la vénere,

Ortie

Grièche



Urtica urens

Borago, Buglossum verum.

Courache, Bauroche.

Plante dont la racine est blanche grosse comme le Doigt, lorsque au bout elle pousse des feuilles larges arrondies, luisantes et délicates sur toutes leurs surfaces, recouvertes d'un poil court et doré dont elles sont couvertes. Les tiges sont assez robustes et de grande taille, piquantes, brachiaires, brutes, d'un peu de rouge, garnies de quelques feuilles semblables à celles du bas, mais un peu plus petites. Ses tiges et ses branches, le terminal peuvent former un bouquet de trois ou quatre fleurs blanches le plus souvent quelque fois blanchies ou couvertes de givre, et leur blancheur à une certaine distance paraît être verte, cette couleur en étant perdue jusqu'à la base, il devient alors grand lorsque la fleur est passée et il présente quelque semences qui ressemblent à la tête d'un coq :

La fleur en corolle ne dépasse pas la hauteur d'un ou deux doigts. Bouillonnante et très sucrée lorsque par le soleil la température

Bourache, Bouroche



Borago officinalis L.
Det. n° 30.

Fistula celtica, *Ceratodon purpureus*);

Inguinalis Aster Sinenus

Reine Starquodde, Aspergulle.

Cette plante se cultive dans les jardins, ses racines sont
élevées elles-gênes sur lequel l'arachide croît, un peu plus ou-
goutte d'eau pied et plus brûlante, garnie de silex arrosé et
vers deux quarts portant à la base, terminer l'appartement en
l'eau bouillie, les fleurs viennent à l'heure des déjeuners sur
le brûlage, elles sont rares, connues sous le nom de fleur de lait qui
couvre le centre de deux fleurs portant, au bleu, ou
blanc qui donnent deux couleurs, les fleurs sont faites
de feuilles minces, droites et parfumées sans senteur.

Aster. Reine marguerite



Aster chinensis L.

Lithospermum minus erectum, Nilium
Solid:

Grenoble, verbre. aux Sociétés,

elle présente l'œil à la bouteille de deux poings ou environ. Sa
tête en oblongue se branche par une sorte de coude en éventail
éminable à l'effet de l'éclairer, mais plus étroite, plus
métte et plus ronde, celle qui sous grise de l'animal. Son
couleur peu forte. Ses lèvres sont courtes, sombre et
luisante, sur la mouture desquelles, avec des petits stries
jaunes ou orangées très petites, suivent des veines sombres
qui laissent apparaître des taches assez fortes (éminable à une)
grande partie

Sur recommandation de Remy et son frère Maurice
on n'a pas vu le nom avec bâton d'assemblage, où on voit
que l'assemblage prendrait la forme d'un cercle de deux blancs que l'on
voit. Le matin à 7 h.

Gremil, herbe aux Perles



Lithospermum officinale L.

Crostularia Minora.

~~Crostularia~~ *Seroculaire ou Sorbereuse Sieged.*

Le tanche ou le crostule est coude, qui jette quelques branches aux extrémités, et quelques feuilles sont ovales, pointues, toutes égales, et presque toutes à la même hauteur. Toute cette plante est plus grande que la serre au bout de deux mois. Son fruit est une graine ronde, la taille d'un doigt, et renfermant un petit pétiole, une tige et une feuille, elle est couverte de poils très courts, et garnie de quelques glandes.

La poussée fait des racines, les feuilles bien grillées et moulées avec deux tranches de pain gardent dans un pot de terre à l'humidité, jusqu'à ce que la semence germe à petit feu, mais très lentement, cela fait au moins deux mois pour que les fleurs soient apparues.

Serofulaire

herbe aux siéges



Scrophularia nodosa L.

(*Capillus Generis, Plantum*).

Capillaire. Adianter:

Cette plante a ses racines comprises comme celle du Solypode changé de quelque fibres noirâtres, ouvertes de plusieurs membranes, faites de ramifications. Ces rameaux sont divisés en deux branches, une plus étendue ou moins, brunes avec un peu d'herbe, et brune aussi à leurs extrémités, chaque branche est tronquée de plusieurs rameaux, ou plusieurs aiguilles. (Sous la *Triangularis*). Petites, rondes, et dépourvues au leur bord. L'extrémité par une petite queue du côté de la pointe des deux angles garnie, pas des aiguilles. Non folia qui sont la charpente) dans une grossesse fort fine que est la graine de celle plantes.

On n'en fait un sirop vertement ou le parfum en gousse de l'Afrique pour plusieurs malades ou soix et auquel on en met diverses bouillons et avec les tisanes ou sauterelles appétitives et pectorales.



Capillaire, Adianté, Politrie.



Polypodium adiantum-nigrum L.
Capillaire noir.

Cariophyllus Silvestris, Vulgaris latifolius.

(Aillet sauvage)

Plante qui croît dans les lieux sec et multe, il a sort d'
racine qui est ronde longue et chevelue plusieurs branches s'enroulent
sur elles portant des petits grappes de feuilles longues et très
droites, du milieu desquelles des sortes de tiges de cinq a six
pouces d'hauteur naissent, il sort de chacun une ou deux feuilles
un peu plus petites que celles du bas, au bout de ces tiges
il y a deux ou trois fleurs qui se succèdent qui sont composées
de quatre pétalos rouges et quelque flor née de blanc.

(cette plante est dessicative et chaude, on fait de ses)
(feuilles un vinaigre qui est bon pour faire remuer les convulsions
et contre lair pestilential.

3^e Jeune poing de garde du Roy ou
l'on en regarde les graines avec plaisir.

Oeillet Sauvage



Dianthus carthusianorum L. Varietas.

Mille Folium Vulgaris album, Stratotet
chytophillos.

Mille Feuilles, Herbe militaire, 21)
herbe aux charpentiers :

Cette grande plante des bois a la hauteur d'un pied, ou deux pieds
et demy, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde, ronde,
les feuilles sont rangées sur
une tige, deux par deux, semblable a celle de la camomille, l'une
dans l'autre, et d'un goût un peu amer. Ses fleurs naissent a la
cime des branches en bouquet. Ces fleurs, chaque fleur est rougee
étoilée, ont une grande tige cylindrique, composée de plusieurs
feuilles égales. lorsque la fleur est passée, il paraît des
ananas rouges.

Cette plante est vulneraire resolutoire et astrigente, son huile
est moins forte que celle des autres fragiles, et surtout le cours
des gouttes des humores vides et des fleurs blanches :



Millefeülle



Achillea millefolium L.

Asparagus, Salis.

Asperge.

Plante dont les racines sont composées de plusieurs filaments longs et grosses la partie ramassée ensemble ne vaut pas durable fort dur, et son rapport plastron et ligot qui desservent en tout branchement toutes de très bons fruits et garnis de poitrine, j'aurais toutes, bien connues et comme cest l'espèce longue il me devient une. Ses fleurs naissent à la longueur des branches, elles sont blanchâtres et parfumées et leur floraison dure longtemps et donne une grande quantité de graines qui se conservent plusieurs années. Son nom de la race

est racine soit très opérative, sucrâtre, rase et la longue elle servent de garniture dans les bouillabaisse dans les sauternes et cause des bons odeurs et de bons goûts.

Asperges



Asparago officinalis officinalis

Apionaria) Lychnis (*Apionaire*).

Cette grande plante de la legne, haute d'au moins deux pieds, aride,
rouge, rousse, rougeâtre. Le Système a grêle, les feuilles sont
larges, nervosées, semblables à celles du Plantain, mais plus serrées, et
opposées. Les fleurs naissent comme en ombelle au sommet des tiges
chacune composée de cinq feuilles disposées en étoile ordinairement
belle couleur pourpre quelquefois rose quelquefois blanche, odorante,
ayant au milieu quelques petites étamines blanches, le Stipe sous
la tige presque lenticélos longs, et deux fois une fois enveloppés
dans le calice, rempli de sanguin minime rouges et rouges. Les
racines sont longues, rugueuses et rugueuses et croquent sous la dent.

Cette grande a une grande haleine salteuse la peau, et en l'appelle
les Sautes.

Saponaire



Saponaria officinalis L.

Salicaire

Ysimachia Spicata pruriens,
Ysimacie, Seconde Copee)

C'est une plante dont la racine branche considérablement et donne plusieurs tiges rougeâtres qui s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds, velues au peu cavillée, et noueuse par intervalles, se couvrant successivement d'espèces de feuilles, longues et sublisses à l'extrémité, du reste un peu plus large, il naît aussi sur de ces feuilles des petites branches, à l'extrémité desquelles sont les fleurs formées en grappe dont chaque fleur est composée de plusieurs pétales pourvus d'étoiles par un centre verdâtre sauvage ou bordé, du milieu duquel sort un pistil qui égale la fleur et qui devient un fruit sphérique de la grosseur d'un grain de coriandre qui souve à sa maturité en plusieurs parties et continue plusieurs semaines pour la laisser.

Cette plante est astringente.

Salicaire

Lysimachie



Lysimachia salicaria L.
Salicaire

Cardiac. Agriupalma. Marubium,
Cardiac dictum. Agriupalma.
Agriupalma.

O

Cette plante a la tige fibreuse, Ses tiges sont droites, quarrées et s'élèvent depuis trois jusqu'à dix pieds elles sont garnies de feuilles opposées deux à deux, alternées, occupant aussi profondément, l'espace au deux bords; les bord obsoles, et un peu velues. Celle de bas sont subdivisées en celles de l'acanthe, et de l'acanthe, au hui que celles de haut sont tiges vont toujours en étaillant perdent de haut en bas, et deviennent tronc, et dentelé, et ffure sont sur la base des feuilles, elles sont garnies de feuilles en queue, ayant la forme supérieure plus ou moins en queue le pied longue que l'inférieure qui est portée en trois, lorsque fleur est renfermée dans un calice en forme de cornet; dont le fond sont contournés quatre, fourmis aux glandes :

Elle est bonne pour les malades du cœur, celle qui a galopodatua les de l'alliance de

Agripaume



leonurus cardiaca L.

Convolutula major albæ, var
arvensis helxinei Assamplatos.

Liceron blanc, ou de Nigre, Lise'

Levenges, 210

Plante qui poussse des liges longues, grêles, s'arrondissent
que j'étais faut et rongéant, enboussant lez branchs des arbres et
des arbrisseaux voisin et lez haut a lez branchs et des rameaux
sous lez liens a l'arbre. Ses feuilles ressemblent a
celles de l'herbe, mais elles sont plus grandes, plus molles, plus
doux que toutes les autres, la fleur à la figure d'une cloche
de couleur blanche. Quand elle est émoult il lui donne un fruit
presque rond, gris comme une peau de porc, membraneux, couvrant
et secouant jusqu'à ce qu'il soit rompu.

Cette plante est assez robuste, propre pour l'abri et pour l'abri des oiseaux.



Liverton


Cowbelles Spine!
Grand Lescure

Muscus terrestris et Pilosus.

Mousse Terrestre:

Cette plante croît sur les pierres, roches, et sur le sol, mais sur les bois et dans les deserts humides, ses feuilles sont minces comme les cheveux, molles, vertes et quelquefois jaunâtres ou rouges, et aussi petites et minces.

Cette plante est très utile, propre pour arrêter les hémorragies et doit être appliquée dessus.



Trichomanes, seu Polytricum officinarum Polytric Capillaire.

Plante qui croît sous les bois et sur les murs à l'ombre, qui a plusieurs racines minces comme les cheveux qui se ramassent en une sorte dure et noire, ses feuilles composées de quelques autres (petites), vertes, presque toutes également divisées, sans une tige droite, mince, rameuse. Ses rameaux naissent sur le dos des feuilles des tout minces (comme de la poussière) parmi lesquelles se voient plusieurs caudules ou poils épaisseurs garnis d'un bout à l'autre, qui par la contraction se détachent et font faire sur les rameaux, sans lesquelles sont enfermés quelques-uns.

Cette plante est très utile adoucissante, et purificatrice.

Mousse des Bois



Sauve vie
Capillaire



Adiantum trichomanes L.
Polytric.

Museus terrestre vel Galgellusimus. Mousse Terrestre:

Cette plante croît sur les pierres sèches terreuses, maigres, stériles,
sur les bois et dans les roches humides, les feuilles sont
minces comme les cheveux, molles, vertes et quelquefois jaunâtres
ou rouges, sur aussi grêles et minces.

Cette plante est attirante, propre pour arroser les
immondices étant appliquée dessus.

Trichomanes, seu Polytricum officinarum Polytric Capillaire.

Plante qui croît sur les bois et sur les murs,
l'ombre qui a plusieurs variétés minces comme les cheveux
qui se courbent en une sorte dure et noire, les feuilles composées
de quelque autre (d'ailleurs) sorte grêles, presque toutes également toutes
des poils sur une tête blonde, mince, verte, fragile. Les feuilles
naissent sur le dos des feuilles des tiges minces comme de la fourche
parmi lesquelles se trouvent plusieurs capuches ou poches épaissies
quand bien croître assez, qui par la contraction se déchirent
et font (une) sorte d'appendice, sont également quelques
minces.

Cette plante est opérative administrante, et protectrice.

Mousse des Bois



Sauve vie
Capillaire



Adiantum trichomanes L.
'Polytrichum'

Geranium africanum, malve folio
Plante de l'Afrique



Geranium d'afrique



Geranium zonale L.

*ancus Salicis, pubescens, Salix
cennifolia. Carotta.*

Carotte Lémenade.

Plante dont la racine est un peu long s'inscrit curvamente
brunâtre qui donne peu de fibres, cendre, charbon. Soudainement, sous
la racine une tige; tenuet rouge, tendre et fine (tendre et, rouge
foncé, tantôt, l'une et tantôt blanche) à feuilles d'oranger ou grises
et bruy, feuilles plus ou moins épaisses (épaissies en arrière, longues)
de hale et assez grosses, rares en plus ou moins (grosses qui sont
rares subdivisées en une infinie) s'arrêtent avec le long. Elle
est verte et velue, et d'une odeur aromatique. La tige qui élève
la partie de feuilles, a brochette de quatre à cinq pieds, terminée
par une fleur (fleur terminale aussi bien que feuille)
composée pour ses amplexes, jointe au hale (montant de plusieurs)
brune et feuilles disposées en lanières (longue et étroite). Ces
amplexes sont composés de fleurs à cinq étalles blanches, moyennes
échancrées, et disposées en fleur-faisceau. Le pistil qui
soutient la fleur, ressemble un peu à un grain d'avoine, forme
grosse et épaisse pas l'endroit qu'il est. Le bouton, lorsque
l'ovule, environ la hauteur des, sur le bout et garnie de poils courts
blanchâtres renfermés en manière de gaine.

Se trouve dans les plaines.

Carotte



Daucus carota L.

*Vicia Sativa Vulgaris Semine, Negro, Vicia
Vulgaris acutiore folio crenato parvo Negro-
Rescens, ou Vesce).*

Plante qui pousse des tiges à la hauteur d'un pied et demi, sa plante
jaunâtre, anguleuse, macleish, orange, ses feuilles sont enroulées. Je dis
ou deux parmes de feuilles oblongues et étroites veloutées. Petalées toutes
lisses et brûlantes, rougeâtre, sur une Côte, terminées par une pointe mince qui
battache aux plantes voisines, sa fleur est également de couleur
rougeâtre ou blanche; l'ovaire est grasse, il n'a pas sucre mais
quatre velles longues; le fruit est semplice et terminé par une
ronde noire.

Cette plante dans les champs, elle est bonne pour
la nutrition des bestiaux. Les feuilles sont fort grasses et grasse.

Vesce



69
Vesce
Vicia

Cicuta Major.

Grande Ligne :

Cette plante a une racine pareille a celle du pavot, quadrangulaire et de bord blanchâtre en dedans, son extréme gout est d'une eau forte. Les feuilles - quelle pousse sont decoupées en plusieurs segments. Comme celle du pavot, une ocreuse, avec un bord oblique. La tige (telle des quenouilles) a cinq pieds, elle est ocreuse, lisse, noueuse, branchede, quinze pas intervalles de feuilles, finement incisées, plus pointue à mesure qu'elles s'éloignent. Au bas de la plante cette tige et les branches portent des umbellules de fleur a cinq petites petioles blanchâtres - rigides, disposées en fleur de lit de fleur, a ces fleurs toutes des sommets aussi nombreux que celle de l'anis, ouvries dans leur tige au bout desquelles sont vertes brunes.

Cette plante en un poison très dangereux et comme il est - ressemblant au pavot (c'est à dire qu'il a une racine) souvent que par inhalation on l'emploie dans la cuisine ce qui cause l'empêchement d'avoir des fausses, ou l'empêche de copuler pour empêcher les humains de prospérer, jadis les Juives de la canne et de faire.

Cigüe



Nelumbium aquaticum L.

(10)

Querola herba. Salicid. folio:
(Jaude, ou herbe jaune).

Cette Plante à une racine qui n'est pas profonde, et y passe dedans
quelques feuilles d'un bord qui est courbé, les autres sont droits. La tige
qui sort de cette tige a trois à quatre pieds de haut, et est couverte
garnie de feuilles étroites comme celles du bâton, et toutes longues, en
proportion qu'elles approchent des fleurs, qui sont disposées en grappe,
assez longues, et composées d'hautes et très-fines pointes protégées par une
petite branche, ces fleurs sont unies à une feuille. Les feuilles arrondies
couvrent le tout, pointées qui empêchent les feuilles d'arriver à la terre.
partie ronde.

Les boutons se servent de cette plante pour faire la jaune.



Famælum Vulgare Lutet.
Leucanthemum,
Camomille Lutte, Marette).

Cette plante à des rameaux, tiges, blanchâtres et chevelues,
elle donne une tige, quelque peu plus épaisse, toutes d'une fine manie,
toute soit peu velue, garnie de feuilles alternes, deways où sont inserées
des fleurettes soit aussi étoilées, toutes plates, plates
de lae d'oeur Salive, et d'un très grise, des cistelles sortent
des boutons changeant de couleur, fleur radieuse (un peu tapissée)
et qui n'en diffère que peu de deux fleurons qui sont plus amples
et par son odore

On emploie la fleur de cette plante en médecine, par exemple
en restorative, conservative, astringente, et cicatrisante, ou l'emploie
aussi en fumigation en cataplasme, pour des rhumatismes, &
également le ventouse, en decoction dans le Larmement pour la
cathartique; et la poussière est un siffrage vigoureux dans plusieurs
morceaux. Elle est moins puissante que la Camomille romaine.

Marouille , camomille Rante



Anthemis cotula L.

Malva Minor.

Luisse, Mauve, Alcée

Elle fleurit en juillet, l'inflorescence forme que pour
les catées à la mauve vulgaire, l'éclaté que les catées qui
n'ont pas de longues tiges. Son développement est proportionnellement
que des fleurs aux tiges de 6 cm. Vojeté fol. 120.

Mauve

Petite espece




Malva alcea L.

Pulegium, Satisolum :
Loulots :

Plante qui pousse sur tiges minces grêles,夸克ées, velues,
couvertes à terre, et feuilles tout presque toutes nuées, et
fleur toute en gauze. Les poires, par manœuvres au tour des tiges
se coulent facilement et promptement, rarement blanche. La racine est
mince et forte,

Cette plante est oppositive hystérique, propre pour les
malades d'Atoneac, elle a une odeur puante et ardentique.
Son goût est fort amer et fort amer.

Pouliot



Mentha pruriens L.

Euphrasia officinalis. ophthalmica
Fraise Cassie Lunette. herbe aux yeux

Cette plante qui se fait au plus que la hauteur de
peu, est basse et fait racines naines. Branchettes courtes,
et terminées d'extrémités de tige et de boutons. boutons, garnis
de petites feuilles rondes. sous à deux semblables en quelque mesure
à celles de la jasminette. plante verte, plus pommée. S'au fil
est fermé, tout l'an et ne pas faire de boutons. les fleurs
ne sont pas si belles, sont toutes toutes toutes toutes
vertes sans blanc, verdoyant vraiment en verdure, qui
couvre plus haut le peu de tiges qu'il a. fleur rose
ou rouge tachée avec un centre et rouge pour quelque d'entre
proprement. les boutons et boutons sont toutes toutes.
J'assure, la plante qui fait tout le plus est à quatre poins. A.,
et toutes ces plantes qui a servir à prendre à la tige, et faire
en quelques lieux lequel lequel est en diverses en divers
lieux qui consistent de la tige naine et duquel il n'a
tambours;

Cette plante en temps froid a du faire fort bien et
se estable la tige en l'induis ne prends que tel ou quel
japon et tout autre chose de la tige de l'herbe, et faire
en boutons tige quelque moins. Cette plante est une plante
pour le temps de l'hiver et est estable la tige il n'a
tambours, en la plante comme de la tige pour les graines. Soit
que ce soit plus ou que la plante.

Eulâaise, Casse-lunette



Eubrasia officinalis L.

Solanum vesicarium quod folliculi
vesici in state climeti

Solanum alicacabum vesicaria

A Kœange. Fraillant. Lignac, ou Lignette,

Cette plante est de la famille des Solanacées plus, elle est
branche et a les feuilles comme celle-là de la moelle
l'arête large la tige rameuse, le feuillage est large, à lames, elle
porte de petites fleurs blanches, boutillées à une fleur au moins
l'arête large la tige rameuse et fine comme une branche
petites feuilles et pointues.

C'est généralement cette plante qui donne la maladie
de la peau ou acroïdit, de la tête et la gencive blesse
qui cause la fièvre, châine la partie des os et de la
peau, paralyse les vésicules, incruste la tige.

Alrecange.



Physalis alkekengi L.

Smilach Ortincil, Sive phascolus major.
Baricot phascolus de Cocteau :

Specie de legume qui à tel longe longue et mince et
qui empêche toutes porches voisines autour desquelles elle s'entortillent
les feuilles sont larges et quelque basse, poussant en pointes,
quelque feuillestelle a celle de laurier distes de feuilles vertes
offrant elles nient tout laurier feuilles quies, comme le
cèdre, les feuilles sont leymenueles, parfumueles, blancheton et
rouges, lesquelles sont grosses et lourdes des pétioles
longue, lourde, appeler le chouquet qui contiennent plusieurs
sortes de la figure d'un poète sans fort poëtes, le second
contient : il y en a des blanches et rouges, de jaunes, de
rouges, de vertes, de bleues, de saugelettes :

haricot, Phaseol



Phaseolus vulgaris L.

Katumuraria Louronychia, Soc
Stata pectinata.

Rue des Murailles : Capitaine.

Cette plante à feuilles et à tige vert piqueté de poils
a celle de polyptile ou sauvet viole, ses feuilles sont feuillettées
au lieu de laire de jardinière, ses feuilles sont toutes les deux des
feuilles comme celle de l'ortie des Capitaines. Elles sont toutes
terminées par un pique bâton : 1


Coronopus herba Stela Vel cornu
leporinum

Corne de Cerf :

Plante qui approche beaucoup de plantain. La racine est grosse
au pied comme le petit oït. Chaque branche a une goutte au bout
qui ressemble à une goutte de lait. Ses feuilles sont disposées en
roue, elles sont oblongues, bordées d'éperons, avec bord assez
profondément : en sorte qu'il faut casser pour émouvoir —
Les feuilles sont suspendues au bout de ces branches aussi. Le nom qu'on a
attribué à toute la plante de cause de ses feuilles est bien connu
en plusieurs lieux. Longs de quelque pouce et garnis de flans
et de lombarde grosses comme celles de plantain, on ne distingue
ces deux plantes que par leur feuille : que donner le
plantain sous forme, et distinguera la corne de Cerf.

On la cultive aussi dans les jardins pour faire manier les enfants.

Rue des muraille
Capillaire



*Rue des muraille
Capillaire*

Corne de cerf



Plante coronee

Fruneratum Sarracenicum, Sagopyrum. Pet. fago.
Criticum.

Bled Noir ou Blé Sarrasin:

Cette plante a une racine fibreuse et tronquée, et pousse une tige
d'autre d'un pied et demi ou environ mince lisse, droite et quelquefois
courbée, branche, chaque branche alternativement, terminée par un
feuille; elles sont toutes comme un tour, toutes avec pas de graine
qui va jusqu'à deux pouces de long sur huit ou dix, les feuilles de la base
de la tige qui sont plus amples à vertex lisses, arrondies, et d'une
goût fade; leurs graines sont minces et quelquefois appréciables de
l'épaisseur des branche, et en cet état, elles sont aussi fines que
les feuilles, mais sont des graines minces et longs d'une pouce environ qui
portent des poils courts, et sont parfumées; Chaque graine est
composée de cinq lamelles solitaires par une calice blanc et lisse
de pourpre, divisé en cinq parties jusqu'à la base. La graine
qui se trouve au milieu de ces lamelles, devient une graine élevée
le plus souvent de sorte qu'on la voit dans l'enveloppe qui a
sorti de calice à la fleur;

Il sort à la Nouvelle époque du bouton d'au moins deux ou trois

Sarasin
ble d noir



Polygonum perfoliatum L.

*Tramonium a ructu spinoso rotundato
Semino sanguineante*

*Solanum pomo spinoso rotundar longo
tore Noxmetella*

Tramonium Lomineus lignosus Noxmetella

*Slante que proutte una lage a la huitaine ouiniesse son pecto
et qui a des multes amers et amers, donez odore fresa amers per
longe de la lage et des quincez solane et x lez. Slante a des des grande
languants blanch et multe blanche et quelque murens a une viree et
boies et lez donez laurier des feuilles, quelque roudz greez communis son
nire jureste de la premure. Corre et auant des poysonneux et des roudz en
quatre loges qui transforment lez lauriers et roudz et cognaies et*

autre roudz est un fortifiant et rameant et purgation et medicina

Pommier Rquant



Cesserach, et L'ostenium, Singua
rina officia, et
Scolopendree, la quale de Cest capitaine.

Cette tenuer este de ce que le fait de son pâtre est quelque
avantage, et quez ordeneement au Seigneur le Renge et Daivis
leur longe pouleterie en laquelle de l'aque la grande et la petite sur le dor et
couler dedes et d'autre nombreuses roudies dedes leurs longueles, et qui
renferment un grand de laque et de la tenuer autre de
l'aque que corresponde syale est ce que a mortis. Il est
ordonne que la construction de l'ost est que il suffise de l'aque
autre longueles, si nentier est q. l'aque est au mire des

Le esterme au asturante, prede, ale, Prelu uine, lequel le ost
des autres pâtres des capitanes.

Scolopeindre

Ceterach



Ceterach lobocladum L.

Oreicula avisi. Sanicula Alpina.

Oreille d'Ours.

Cette plante pousse de la racine des feuilles, grandes, pointues, grasse, tout à fait épaissies, tout à fait entières, bien rondes, il n'y a pas d'entre elles de tiges qui portent de longues feuilles, de 4 ou 5 pouces au maximum, de quatre ou cinq, plus ou moins, dont la longueur, est proportionnée pour chaque pied; chaque feuille a un large bâton en entourant à pavillon, découpé en deux ou trois parties. Ses feuilles sont toutes d'un certain brame, renfermant dans une gaine presque ronde. La racine est grosse, garnie de glandes et très blanchâtre.

Oreille d'ours



Sinclairia unicala

Solanum halicacabum

Chomalek:

Thomates



Solanum lycopersicum L.

9 Herbier L'Asperge Barbaud.

Bouillon à l'anc.

Plante de la racine et le feuillage blanchâtre, de l'apparence d'un
poison, plus bronzée que et chargé de quelques fibres minces et
courtes l'été, cette racine est garnie de feuilles longues, lancéolées, ovales, molles
et effilées, courbées vers l'axe, blanches et bronzées, sur leur bord,
la tige qui sort entre les feuilles, terminée à la hauteur de
quatre à cinq pieds et quelques centimètres, forte velue, molle et
coudre, garnie de griffes et d'écailles, avec lesquels sont accrochés, griffillons
à celles du bas, boutons, petits, qui contiennent la tige à deux pour
une base, qui forment des grappes sur la tige, ce qui la rend difficile
de cueillir. Son développement au printemps (lorsque fleurit une rose) est
jaune, blanc. Ses feuilles sont dépourvues de poils ou de griffes (accroches),
elle est bordée par une partie à longs poils et velus. Le poisson
qui s'embobine avec la plante devient un fruit ou une coquille, et
commence à pousser dans les deux lobes par une longue sécession interminable
et continue des semences minces et rugueuses et brunes;

cette graine est forte et fine, allongée, entourée d'une
matière de la couleur, pour les racines de vingt et trois de la
différence que les matières du poisson. On la coupe en deux
feuilles et deux tranches;

Bouillon Blanc



berberis corymbosa!

Nigella sativa minor, Sibthorpi candida,
Gib ou Melanthium chrysanthum:

Mille des Jardins, Lovette:

Plante qui pousse des tiges à la hauteur d'un pied divisées en plusieurs branches les feuilles sont médiocrement larges, rectangulaires, minces, lisses celle du feuille, fleur toute roulée aux sommets de ces feuilles, assez grande et serrée, une de l'autre compoſée de plusieurs petites larges dans leur milieu se roulant en pousser des poches de feuilles blanches et laineuses qui sont assez grosses, divisées en plusieurs loges qui renferment des semences roulées ou rouler d'une couleur noirâtre, d'un goût râpeux.

On la fait de la fin pour réchauffer et pour faire échauffer le poing des hommes, pour augmenter le lait des mères, et pour assoupir les bœufs aux foins.

Nielle yeux

de Venus



Nigella sativa L.

Scorzonera latifolia Simulata,
Scorzonera Hispanica
Scorzonere, Rizerne, ou Cépentine.
Succise d'Espagne :

Dame qui portez une Lige a la hanche et deux pieds.
de l'oreille au genoulet ramassez douze tiges fraîches
longues et non ayant la tige plus longue que l'assortie, rameut
par une poignée longue et abordée d'une Voie oblique, et le plateau obtenu
des boutiques a faire ramer, fauveler, rameuter par une tige de vingt
longs grêles. Composez-en plusieurs et que ces poignées de la
figure d'une bouteille. Les rameutes et les longues tiges blanches
larmes d'huile d'une cuillère. Ce qui est longue d'un pied et grosse
comme le pouce ou deux blanchies en éclatant, froides, fauvelées,
larmes, douce boîte à parfumer.

Cette préparation est parfaite contre les membranes et l'ypsose
et les autres crampes, contre les affection de l'urine, contre la
mélancolie, le tristesse, l'aperturale, on mange la racine après
cuisson et cette et ratissée elle a un goût agréable.



Scorsonnaire

Sersifils

*Parietaria officinarum, betxine
Perdicior, Picolaris, herba muralis*

Parietaire:

*Plante qui pouest est leigte (coudez rongezez), ramusee
Les feuilles sont oblongues, pointuees, veluees, rudes, s'attachant
solidement aux habitt de porc et alternativement. Les fleurz (les)
petites, composeez ordinairement de quatre (quatre) boutonnettes (petites)
cubiques de differentes structures. Il feut au contraire une forme de poire
fort grattuee, laissant une enveloppe velue. La racine
est fibreuse et ruguee.*

*Cette plante est au contraire et laxative ou feu, fort bruyante dans
les larmes et douce les oreillers et les dents et adoucissante,
elle ne fait pas mal les reins et les reins tout a fait les rives.*

Pariétaire



Parietaria officinalis L.

*I*liburnum, *Lantana*, *Barbafava*
Niorne. Barbe aux queues, barbe de
Jupiter:

Chabriéean (oit q' l'ville qui croit dans les bauges...)
vissant d'ordinaire fruitée tout blanche, ronde, grande, grosse, et
aussi tout en pectine si que pleine de quilles. Ses 3 ou 4 pétal.
en tout bord noir profondement, elles sont velues, et croisent
des sœurs (soit de la branche pris deux et juxtaposées) la fleur
est blanche et grise et touquillée de laquelle (soit sur son graine)
appelle (comme l'asselle) Viod ou Jumelles (qui est rouge)
et cette nuit, toutes ces graines sont aux cheveux. Since
graine de petit également blane qui lors dorme la gueule d'une
barbe, les racines sont grises de fleur de roses.

(Cette plante est aborigene de l'Amérique pour reformer le
tout à la main grande, cette, et Bragée fut de la gloire pour
peindre le pétale blanc, apothicaire sur la peau elle vitrine
il fait levier de la Vierge)

Viorne



Clematis vitalba L.

Serpillum Vulgaris minus;
Serpulet:

Plante qui pousse plusieurs tiges, toutes lignosées, garnies de
rougettes, un peu veloutées, ramassées, les feuilles sont presque
rondes, avec des bords plus larges que celles du Cypre, d'un
goût aigre et aromatique. Ses fleurs sont petites, disposées en
maison de tête, de couleur blanche, ou griseâtre, elles naissent
au sommet des tiges, lorsque l'olla est en voie d'ouverture par
le bout ou dans les éd., suivant par un calice fait en forme
d'entonnoir cette fleur est placée, il lui donne de ses feuilles
presque toutes en forme de lance à la pointe, qui a servi à
l'aiguille à la fleur. Ses racines sont lignosées, garnies de
beaucoup de fibres.

Cette plante est propre pour les Vignerons; elle fortifie le
corps et l'estomac, elle empêche les obstructions.

Serpolet



Thymus serpyllum!

(38) { Cupidorum Silio Subrotundos sive
Vulgationisnum, Leptophila Vulgarissima, sive
arvensis.
Perseaeuille: Voyer Sage 219.1

Buccabonga
Perce leuille



Duplessis rotundifolium L.

Occabunga.

P

Plante aquatique, qui a une épaisse tige ronde, grosse, rameuse, rongeable, inodore, sans piquant. Ses feuilles sont rapprochées, étroites, étiquetées, d'un vert luisant sur le dessus, et d'une couleur grisâtre sur la face inférieure. Elles sont disposées en éventail à角度 quinconcique. Les feuilles sont minces.

Cette plante contient dans son tissu de l'acide sulfurique, d'huile et de phlegme, elle est détoxique, analgésique, expectorante et provoque l'urine. Le fruit est un petit fruit d'Yveline, et des graines, et lorsque la graine est broyée, il libère l'acide sulfurique, et pour éliminer la mauvaise haleine, on la pisse au fond de la bouche comme le Cognac ou la sauge comme le Cognac.

Beccabonga



Vizcaya beccabunga!

Santiago Galveston
Plantain aquatique.

Cette plante a la feuille grosse (brouette), ovale, et plus large que celle du plantain a Sept Heures, elle pousse en rosace. Comme une lame, à tige) a trois ou quatre pieds d'hauteur. Moucheté, Couverte de petites fleurs blanches. Sa racine est fibreuse blanchâtre et fort multiplicité.
Les quadrupèdes approchent les animaux qui cèdent leur au soleil plantain:

Plantain Aquatique



Alisma Plantago aquatica L.

Ocellus Indicus, Lunacatum affricanum,
Carophillus, idem minor.

Petit Oïillet D'Inde.

Plante qui pouuoit sans doute s'envier le long pied
qu'elle donne de force, assez ramouue, et feuillue, tout
jambellee en quelque maniere a celle de la laurier, oblongue,
pointue, pointee au bout, rongee & puluissee. Sur une tige
terminée par une fleur & folle, à deux feuilles, dont une
belle majorer. Fleur simple de plusieurs dont les premières sont
d'un rouge bon en l'air, bordé d'orange ou l'orange, les
autres bleu laura, bleu adouci versant, le couvert de
petits, minces, la partie est recouverte de poils de la terre.
par dessous de sorte que tout est noir.

Oeillets d'Inde



Tagetes erecta

*Sedypnoia vel rostrum presinum
dendronia. Leclimbinga :*

Liscentia. Dent de Lion

l'arbre qui a la racine grosse comme le poitrail et remplie d'un
racine lâche. elle pousse a son collet plusieurs feuilles longues
plus ou moins. suivant le terrain, ou elle croît, tantôt hautes,
tantôt courtes, et décomposées le plus. suivant les lieux bordés de
mauvais de bétail. D'autre les feuilles felonnes ou grêle. Simple
ou longue comme le poitrail, plus grande suivant la force de la
plante, qui possède une fleur composée de plusieurs dents —
fauve, jaune, renfermée dans un calice qui se renverse, —
lorsque le soupir qui suivra la floraison s'ouvre. Son
succès. Elle possède une racine grosse et
à que ce à la racine des plantes proches à être
renversée par le vent, et suivant son couvercle ou sa racine.

Cette plante provoque les urines quelle est appropriée.

Pissenlit, dent de lion



Taraxacum officinale

Lycoris Constantinopolitana favoraria
Croix de Jerusalem.

Plante qui se cultive dans les jardins. Elle croît à la
jambes de deux pieds, ses feuilles sont longues d'environ deux
pouces pointées d'un vert pâle elles naissent sur un
tige pour fleurir sont de sorte quelque petite branche et de quelle
taille que l'on veuille pas ses fleurs semblables aux autres
de tout le pays, la principale fleur est au bout de la
tige ou son belle chaque fleur est composée de quatre pétales
propre et changeante et placée en forme batonnière au
centre semblable à celui des éillettes. Ses racines sont fibrauses
et renferment une huile forte et suave à fleur double qui n'est
pas difficile de faire et que parmi les fleurs qui sont composées
d'un grand nombre de pétalles :

Croix de Jérusalem



Panicum


Panic, Panic:

Cette herbe est semblable aux herbes qui sont tiges
et que les gouttes ne mille ou mille, elle n'en offre que 3
ou 4 tout au pommier ou qui boutent une multitude de boutons
de pommier, toutes qui portent boutons sont grises au force
que le tout passe en une grappe.

Le grain est a graine de riz qui est pour toutefois, oy oy
est tout aussi du plus court que le riz ou en tout aussi long
qu'il soit des pommiers.

Panis





Gramina paniculata

Gramen ou chriendant à aigrette:

Cette plante a une racine fibreuse. Ses feuilles sont longues et étroites, elles poussent plusieurs fois par garniture de feuilles, placées alternativement le long du rameau; elles embrassent les tiges. La fleur chante Composita. Il y a une petite feuille longue de cinq ou six lignes velue ce qui fait faire à la plante l'appellation. Fourrure, laquelle est mêlée de blanc et de vert.

Soyé Sayer 102.

Herbe à l'Epervier Grande



Pteratum Chondrilla olio grabe
radice succissa minus

Littæ herbo's Pymier.

nos sentiremos a la grande hora al veras y mas
me digo yo, que no solo tendré a mi compatriota
progresista "el gobernante".

98

herbe à l'épervier, petite



Mouffier rampant
Latine folio Subrotendo Linaria
Segetum & numularia folio Villoto.
Catinne). Velvete.

Cette plante à feuilles presque rondes et roulées, velues et quelque fois un peu décolorées; ses fleurs sont jaunes. L'inflorescence de quatre-pétalées - bivalvées - par une calice décoloré et en deux parties, elle penche le long des tiges ou des rameaux branchés. Ses feuilles sont toutes (sauf celles de la tige) de feuilles, et ont un goût très-vivace.

Cette plante est veloutée et adoucie toute la tige. Les feuilles sont courtement réfrigérante et attrayante.

Muscaris rampans

29.

Elatine



Urticaceae *Elatine*

Lilosella major cyprius hispida
Liloselle Oreille de Rat:

Plante qui pousse plusieurs tiges grêles velues
comme celles des feuilles sont oblongues et arrondies pres le bout,
fouillées aux extrémités par de longues glandes, branched
pres le bout en rameaux se griffant et s'enfonçant, les fleurs
sont fouillées à celle de la dent des lions, mais plus
prolifiques que la jambuète plate, les feuilles sont grêles, il leur
manque des lames ou petites nasees, oblongues, vertes. D'une aigrette !
la racine est mince longue comme le doigt ayant quelques
fibres.

Cette plante est vulneraire et détoxique. Son infusion est bonne
pour la gencive, et pour renouveler l'hydrocapitie. On fait de son
cortex pour les vides et statiques et pour la phthisie.

Moselle



Myosoton aquaticum L.

Paniculum, Bulgarie Italicum Semine
oblongo gustu acuto :
Genivük Commun.

Lante dont les racines sont vivaces, longues, sauf par
un intervalle large où de toutes se grattent à l'ongle pieds et genoux.
La partie verte, juvénile, garnie de feuilles assez larges, l'au-
tre toute émoussée en une ligne droite. Les branches et les tiges portent des
umbelles de fleurs flammées et cinq petites pétalées pourvues
d'un fruit composé de deux semences longuette et étroite.
Cameline et arrondie. La couleur d'appartenance est la violette
ou bleue et jaune :

Il y a deux espèces de genouille le genouillier effeuillé
et l'autre avec des tiges de genouil doux. Soit plus haute que celle
de l'autre :

Les tiges du genouil sont appréciables; les feuilles sont
bien que les feuilles sont terminées, on à regarder la forme
comme de l'oreillette. Celle de la plupart des pétalées -
Végétal. Elle à la propriété des minéraux qu'il a, ou
l'empêche dans l'accretion et dans les rayons :

senoiijl



Foeniculum vulgare

Soracium majus Solio Sonchi Pet
Sonechotij:
Herbe à l'oreiller Chicorée Jeune

Plante qui ressemble par sa racine à la châtaigne et son
feuille à la feuille de lion ou pissenlit elle n'est pas si grande que pour
les bœufs qui poussent plusieurs ligues;

Il est frais et un peu amère, son jus mûlé avec
du lard est bon pour toutes les maladies des yeux;

Joye sage 97.

Gramen, a laigrette



Oryza fragilis.

Anagallis Semina), Cerato Flore) *Mouron femelle).*

Cette plante a une tige blanche, et rousse plus haut, rameaux érigés dressés, quelque peu tortueux. Ses feuilles sont petites, presque rondes opposées sur la tige. Le long de la tige, il y a des feuilles et des fleurs. Les feuilles sont en rosette à longues tiges, de couleur blanche, il y a aussi des petites feuilles fibroresuses membraneuses qui poussent en deux angles remplie de lames minces. La racine est blanche et fibreuse.

Cette plante est propre contre la gencive et contre la moruce de la typhoïde et du cholera étranglé, ou l'inertie aussi dans la main, sans la déchirer, pour l'hydrocéphale et sans les obstructions.

Mouron à la Penesse.



Clinodiplosis media

Carduus Stellatus, sive Calotropis
Chardon étoillé - Chaussette.

*P*lante dont la racine est grosse, longue d'un pied au plus de la grosseur du doigt avec des collerettes blanchâtres, chargée de quelques fibres blanchâtres, et qui donne plusieurs feuilles velues, oblongues sur leur longeur de trois à quatre pouces, découpées comme celle du chêne ou du coquelicot, mais sans pointe. De deux milles part une tige blanchâtre, arrondie, blanchâtre toute d'une pinte ou deux, chargée de feuilles opposées à intervalles, mais plus découpées : ces extrémités de ces tiges et branches portent des tiges écaillées épineuses et grosses comme des noix, et dont les épines sont lisses. De pinte de deux pouces, blanches et débarrassées en saumure d'étoile, lorsque la tige ne sent point l'air, et que les feuilles que l'on pourra ne sentent point. La fleur est oblongue, lisse, grise, plus grande que la graine de perce-neige.

Cette plante est apportitive et diastatique, ou l'apporte avec force pour les coliques grippeuses :

Chardon Etoilé, chaussetrap



Centaurea calcitrapa L.

Veronica. Mar. Cypina ex Sylvestris.
Veronique Male.

Cette plante pousse sur l'herbe grise, rondelet, velue et rampante,
ses feuilles sont toutes opposées à longues tiges et très-serrées
d'entre elles en deux bords, les feuilles sont à cette tige presque toutes
avec un nœud. Ses fleurs sont sur des rameaux de quatre quatrants de graine
blanche. Elles sont au maximum d'ici sur l'affilé de la partie.
Lorsque ses fleurs sont passées, il laisse une tige à charmeau ou flétrit
partagé en deux boursouflé qui sort souvent de la tige et rendue
rondelet, mince et tendre.

Cette plante est vulneraire, diurétique, proptre pour pacifier
le sang, pour rebrousser le fremon ou charge de matières blanches
et pour les maladies de la tête, oreille, bouche et la manure de l'œil.

Veronique Mâle



Veronica officinalis

Chamomelum Romanum, Nobile odoratum
& Leucanthemum odoratum, Culhami.
Camomille C' Romaine:

Cette plante à ses racines fibreuses et charnues, d'où partent quelques tiges minces et lisses, velues et dont toutes sont courbées sur leur sommet environ d'un pied, et que l'ensemble forme une partie de la tige conique ; les tiges fibres ou racines qui se prolongent en terre, sont toutes à multiples branches toutes cette plante. Ses feuilles sont comme celles de Camomille de plusieurs parties ou segments formant toutes soit droites et plates, et elles sont vertes, et quelquefois blanchâtres, d'une odeur de drague qui n'est point à dégoûter, et sont attirées assez près les unes des autres aux tiges, dont l'extrémité est terminée par une fleur radieuse, couverte de fleurs jaunes très saines leur centre, et de longs flacons blancs tout sauf circonference. le calice qui soutient ces fleurs est blanc et de deux types l'un est étroit et étalé, l'autre aussi étroit mais oblongue, riche en leurs aiguillons. Cette espèce de Camomille se trouve quelquefois à l'air doux, soit à soleil que sous l'ombre, fleurissant, et changeant de couleur.

Les fleurs de cette plante sont résolument communiquer opération et fribriage, on l'inspire en fumigation, en cataplasme, pour dissiper les tumeurs aquueuses et vescicantes, et écouler les humides pour la tête et la poitrine est un fribriage facile sans plusieurs malades.

Camomille Romaine



Anthemis nobilis L.

Puerium. ou Teucrium

(cette plante prend place dans les plaines, les vallées, tout presque
partout est occupé en deux bords comme celles de la Garonne.
elles naissent deux à deux, le long des rivières, de deux à cinq.
des branches solides, au sommet desquelles sont des fleurs
joufflantes à cette qui naissent sur graminées tiges, les tiges
sont en épi couronné comme celles de l'aigremoine, et de l'autre
puceaine. Chaque fleur est toutes ou presque toutes d'un
tout occupé très finement.

Teucrium

107



Teucrium Scordonia L.

Cannabis Sativa Champane.

Cette plante à une racine longue d'un ouevy pied. Branches ligneuses, fibrauses, grosses d'un ouevy pouce, aux pétioles lisses et étroites, sans poils ni cogs. Racines, velles, rudes au toucher. Feuille ligneuse et tendre, ovale ouverte (verticale et pinnatifida), cette tige est rebondie brachiale. Ses deux aisselles sont écartées, elle est haute ordinairement de 2 à 4 pieds : sauf les boursiers tendres, elle devient plus grande; elle est tragiée de feuilles comprenant au quartier ou cinquième longus de deux à trois pouces et une ou deux pouces de largeur, 3-4 poignées en maine ouverte, rendant d'un vert beau, relevé de quelques veines. Sur la surface, dentelées ou lisses, et d'une couleur forte, d'aque couleur. Ses fleurs naissent sur des tiges séparées de celles qui portent les feuilles. Ces tiges sont dressées et terminées par un bout de feuille de grande taille. Chaque fleur est placée sur la tige et terminée par une longue tige de laquelle sort une longue ligne de larges, grangueuses, veloutées et blanchâtres évidentes. Ces fleurs sont toutes toutes d'ameur fait ce n'est que sur les individuels feuilles, appellées nœuds, imprudemment, qu'on trouve ces fleurs qui naissent sous la poignée de long des tiges, ces fleurs sont terminées par une poigne de laquelle il sort un embryon et il sort une tige? d'une membrane qui le garnit lorsque ce qu'il soit engagé, la membrane sous laquelle il est enveloppé, ou peu. Composée d'une tige et d'une poigne, et composée d'une poigne qui est à la forme une feuille tendre, douce, et d'un goût délicat. La même feuille donne les deux individuels nœuds et feuilles.

La Semence ou sève de lait est très (mais) contre la tige, et contre la feuille. Les feuilles sont aussi grosses contre la branche; ou ces deux, une, ou qui est grangue pour la feuille.

Chanvre mâle



Cannabis Sativa

Geranium, c Robertianum, herba
Robert.:
Bee de Grue, herbe Robert 2.
Specie:

Cette plante est courbée par terre, ses feuilles sont d'épaisses, très profondément, portées à leur naissance et enfin divisées en rouge, elle est double au petit aux feuilles de l'ajonc, Ses tiges sont courtes velues et rouge portant des feuilles rares serrées semblables à celles du basilic ayant à leur fin une petite fleur rouge. Feuille sur 2 étoiles toutes rouges pour une partie dont il sort une feuille allongée en forme de bee de grue. La racine est blanche lisse et douce,

Cette plante est bonne contre les astreins de la bouche, et on croit que c'est mal a propos que quelqu'un la nomme herbe de l'ossemanie :

Bec de Grue, herbe de
l'Esquiancie



Geranium robertianum L.

Polypodium vulgare, Sive *filicula* *Polyjode.*

Cette plante, à ses feuilles plus petites & celles de la fronde moins
mais feuilles plus petites, disposées progressivement jusqu'au rebord
la lobe en partie évidée & longue. Ses frondes naissent du dos
des feuilles. La racine est longue, grosse comme le doigt d'un
homme renouée, relevée de plusieurs tubercles, de couleur obscure,
en forme de pomme et portant une tige.

Cette plante est heratique, grasse pour empêcher les obstacles
des rivières, grossie le cœur, pour l'affection hydrocephalique.

Voyez III.



Polipode de chene à feuille de fougère

Hyacinthus Polyanthes

Jacinthe, ou Hyacinte.

Toute dans la racine est bulbeuse, blanche, blanche qui porte plusieurs feillages blancs, et feuilles longues (longues) et bien bennes (bien bennes), et oyent (oyent) dirigent à la partie de la racine de faire à des pousses, et sont garnies à leur terminus de deux ou trois (ou quatre) gouttes (gouttes) de fleur qui ressemble à la petite godet (petit godet) que l'on fait à la tige attachée, se portant devant le nez — petit godet, elle forme (elle forme) un bas ou petit coulant (coulant) de quel il relève de petits coulants (petits coulants) qui relèvent à l'ouverture. Une certaine partie (partie) duquel est couverte (couverte) par la partie d'autant de petites Lys (lys), et tout recouvert tout autour de la tige (tige), et y a de l'oublier et de l'ingle (et de plusieurs) couleurs comme blanche, blanche, blanche, grise, verte, et de plusieurs couleurs mêmes : Son jus est fort amable, et il est medicinal en preuves de sauge et reflextive au ventre.

Voyez page 112.

Polipode



Polypodium vulgare

O Filix Querna, Dryopteris,
- ou Sugere de Chêne
O Polypode de Chêne :

Cette plante croît le long des rivières et dans les
forêts dans les lieux humides. Sa racine soit enterrée
ou dans le sol, elle ressentira toute perte d'eau. Elle ressemble
à la Sugere commune. Sa particularité est que les feuilles de celle-ci sont
beaucoup plus petites et n'ont que sept ou huit segments.
Cette plante est autochtone et fait partie des poiss.

Voyez page 110

Jacinte



per acutipetala cincta!

La Martia Purpurea Storei -
~~Spicata odore~~

Violette de Mars?

Cette plante pousse de la racine (beaucoup de feuilles)
presque couverte, dentelée, attachée à de longues queues. Il
faut faire éclater ses poches ouvertes, qui contiennent
chaque une petite fleurie de couleur purpurine, ou bleue (tenuant
sur le voile, d'une couleur, composée de cinq parties), dont
l'intérieur fait partie d'une espèce de tétine ou cybion. Le
calice est divisé jusqu'à la base en cinq parties, lorsque
la fleur est passée, il parvient une ligne qui l'ouvre en trois
parties, et qui laisse plusieurs semences presque toutes,
minces blanchâtres.

Ses fleurs sont aussi un peu farinées et pectotales:
sa gemme est purgative, propre pour la colique, mordetique
et pour la rétention d'urine:

Viollets.



Viola odorata l. Variegata flore, des

Pennecia vulgaris angustifolia.
Pennecie.

Plante qui pousse des lieux gâtés, d'où que, le long de la rivière. Ses feuilles sont semblables à celles du Laurier; mais beaucoup plus petites, de la consistance et de la couleur de celle du Laurier, attachées à des tiges grêles. Elles sont extrêmement rares dans les environs.

La fleur est une Lysine avalee ou maniere de fourrage. Desormais en lacy poelies de boutons ordinaires blancs quelque fois blancs et autrement rouge. Son fruit est à deux lobes, deux chumes, de quelleles sont contenues des semences oblongues, presque cylindriques, blanches ordinairement. Une côté, la racine est fibree.

Cette plante est cultiverée, arboricole, safrage. On est donc pour le peu commode des frangipaniers de l'ordinaire. Ses feuilles blanches, et pour la densité.

Pervenche



Vinca minor!

L'graine Aculeatum:
Chendent Liquant:

Plante dont les racines orangées se trouvent en blanc par
l'ouest entières, dont il sort plusieurs tiges courtes et ramifiées
vers l'ouest, au bout desquelles il sort de très petites tiges
qui sont toutes liquides, et lorsque l'une prend et tombe lentement
elle laisse une goutte, laquelle tombe à terre et devient
plus blanche composée de gouttes qui se déposent lentement
et qui sont toutes formées pâles, entières, non en partie. Voilà
l'oeuvre très primitif et simple de cette plante. C'est
une des deux parties :

La racine de cette plante est une racine presque molle, et les tiges
comme celles de la autre chendeut.

Chiendept. Riquant*Hellaria Graminea L.*

Ranunculus ficaria - figure
Chelidonium minor.

Petite Chelidoine, ou petite Scrofulaire.

Cette plante griseote des saillies presque rondes, rectangulaires, lisses, n'ayant plus neither que celles du hiver et plus molles, marquées quelque fois d'une tache purpurine, la partie longue, se roulant en partie pour faire à la hauteur de la main, blanchâtre en bas, purpurine au haut, sortant en feuilles serrées de petites fleurs tubulaires à cinq lobes arrondis, une belle couleur dorée, éclatante; il leur manque un bout arrondi, voilà toute la forme oblongue:

Cette plante est cataplasmatique, résolutive, expectorante, propre pour les rhumatismes râpés et les scorbut, se applique sur toutes les plaies, sur les hemorroïdes, &c.



Rénoncule Figuière.
Petite Chidoiné



Ranunculus ficaria L.

O Populage

Cultus palustris, floré Simplici;
Argyrum castore
Souey De MaraiD:

Planté tout les ruisseauz sont blanchis, tronches et foit
nombreuses, portant toutes du même troue, les feuilles sont toutes,
disques de légèreté dans leur pourtour le plus haut des deux pôles
des queues qui sont fort longuees, les tiges sont faciles à cueillir,
les pousses sortant des feuilles alternent. S'abstient à celle de
bas mais plus petites, la laisselle des grandes, il sort des
feuilles d'un jaune. C'est tout l'ouvrage de moy pratiqué, et d'une
simplicité d'Amiens.

Populage
Soucy de
Marais.



Callitropsis gracilis L.

Lysimila Peris odorata, Flore Luteo-
Simplici Verbascum praeceps odoratum,
vel Sylvaticum, inodorum:

Prime vere, Brays de Cœu

Cette plante pouest des feuilles oblongues, larges, rudes au toucher
se repandant à terre. Il élève d'entre elles une ou plusieurs tiges à la
jambue d'environ une palmie et demi, rudes, râpes, portant en haut
souvent des fleurs de différentes couleurs, quoit y luna de blanches, des
jaunes, de gris de lis, elles sont odorantes. Leur racine est large
avec deux parties supérieure. L'une est le plus grosse, il
paroit des fruits ou coquilles ovales, qui renferment des graines
rudes, noires et minces. La racine est aussi grosse et longue,
couverte, garnie de longues fibres blanches::

Se trouve tout venir odorantes, et a force propre pour
retirer le cou de l'Egypte: Ses feuilles et la tige sont aussi
odorantes et vulneraires::

Primevere



1. *Primula veris officinalis* L.

2. *Primula veris occidentalis* L.

*L*eucanthemum vulgare, Bellis
Silvestris laule foliata major.
Margueritte ou Lajquette.

Cette plante à une racine fibreuse renouvelée, acre au goût.
elle prend place sur le sol humide et peu profond, pourtant qu'il
soit assez sec, accompagnée de bruyère et d'aulne oblongue, graine
d'aulne. Ses fleurs sont rondes, possèdent des feuilles jaunes et
droites, mais couronnées de feuilles blanches et rouges. Son écorce
est quelque peu râpeuse et celle des racines est composée de plusieurs
feuilles en acaules, ce qui donne le nom de noisetier :

Cette plante est fort délicate et lorsqu'on la fait tremper
dans la ligue, elle se dessèche tout de suite.

Marguerite ou pâquerette



Bellis perennis L.

Cochlearia, *Solidum Subrotundum*,
Cochlearia Siliquosa vel Britonica
Terre au α Cuilleres.

Cette plante est d'ordinaire tout fait avec un peu de sa
racine dans les herbes. Si tout à l'heure il n'en trouve pas,
quantité toute la racine et dans l'assiette, on ouvre les deux
extrémités que de ces écailler. Elle a les feuilles presque toutes
épaisses plus ou moins brunes à celle de la arbolette, dont le diamètre
est une cuillère, et les plus sont presque triangulaires de la hauteur d'un
pied. Les fleurs sont petites et blanches. Compagnie de longs
filz portant des boutons ronds dans lesquels se trouvent
contenant de petits graines complètes d'une graine rougeâtre à la surface
et marron (brunie et blanchâtre).

Cette plante est de l'herbe parfumée rapportée à la couronne
provinciale estoit en paillasses à la mandarine (corde), elle est
d'un point assez forte. Contient des boutons à l'ouverture qui sont bruns
en un avis de l'herbe et vertes et rougeâtres la quantité des membres
grindus.

Cochlearia, herbe aux Cuillers



Cochlearia officinalis L.

*R*ragaria Vulgaris

graudier :

Plante qui vient tout le long à la hauteur d'auant vingt
joucches tout au long, portant plusieurs fleurons roulés et velus
mûrs quins ou soixante. Feuilles en épi. Les feuilles sont longues
étroites, et portent des harches terminées de plusieurs pétales
épanouis, entourés d'un velours. Il n'a pas de racines
qui sortent : le fruit n'est pas du grain qui couvre le centre de la
fleur, il est dans une espèce de matricule, l'ovaire, et mûrit dans une
petite capsule, et contient plus d'une centaine de graines. Le fruit est
bon et de bon goût. Il renferme un jus qui liquéfie
garnet. Je quelques g. broie, ronge et astriugera au goût :

S'il n'entre pas, il fera faire une autre infusion et diffusera. Il en
suffit pour faire une tisane. Bonne pour l'épicerie. Tous les fleurs ayant deux
à diffuser.

U

Fraisier



Fragaria ananassa C. & S.

Hedysarum *Allium redolens*
Alliaria, *pecaudini*

Alliaire herbe aux Poules)

M. 110 plante de la paille
en juillet et au verticile, il fleurit tout en commençant
et l'herbe est de couleur verte, aussi tôt que commence la
fleur, et se transforme tout à l'entier de l'herbe, qui devient une
herbe verte, et lorsque protéger à son écartier et c'est alors
que l'herbe est toute verte, et n'a pas de fleur.
C'est une herbe qui croît dans les champs, dans les jardins,
dans les rues, dans les places, dans les villages, dans les
villages, dans les champs, dans les jardins, dans les villages,
dans les villes, dans les villages, dans les villes, dans les
villages, dans les villes, dans les villes, dans les villes,

M. 111 de cette plante il a été, il a été, il a été
naguère il a été,
il a été, il a été, il a été, il a été, il a été, il a été, il a été,

Yelar Affaire, herbe au aus



Yela L'ameur affaire !

(O
Caryojs Billard) 161
Proflio Faune, Brânes d'or

Claude Divise qui a la racine grosse comme le doigt,
ramifie d'un fau jalle, elle pousse sur ou plusieurs tiges que le
système de racine et en plusieurs branches fan-tomale. Ses feuilles
elle pousse sur plusieurs tiges de longue 3 ou 4 po quelque fois plus
ou moins bran-nagez et les feuilles sont longues de deux a trois
pouces. Les tiges de feuilles sont longues plus la base feuillue est
plus grande.

On cultive cette plante dans les jardins auant de la
beauté de son école :

Giroffier Jaune, Kirys.



Cheiranthus cheiri L.

Impenella Sanguisorba minor
fascia:
Imprenelle.

Plante qui croît des tiges à la hanture d'un pieu ou d'un
quid de denys rongé par manchot, les feuilles sont pectinées, presque toutes
lenticellées, en leur bord vêtues par dessus d'écailler, peu de poils, rangées par
paix. Les feuilles sont grêles, cunquées, velues, au sommet, les tiges
suffisent des tiges roulées, garnies de grêlles fines qui sont des
rosettes à quatre quidées, pectinées, peu rebord. Fleurs en grappes dressées
du milieu d'égouttées. Fleur une corolle l'épanouie, tenuor jaune et
tarder purpurine, son pied est à quatre angles et de couleur grisâtre;
plusiforme une ou deux semaines, sa racine est longue, mince,
divisé en plusieurs branches, cette l'égoutte de toute la graine
rouge qu'on nomme (Cochonille Silvestre)

Cette plante est propre à panser le sang et à établir le
rapport des parties; elle arrête des hémorragies aussi (Hémorragie),
qu'interrompe ou la coupe. (Interrompt la coupe en partie).

Rimprenelle



Poterium sanguisorba L.

Anemone Anemone, Lasse Fleur.

Cette plante a des racines rameuses, dont naissent ses feuilles qui sont tantôt arrondies, tantôt pointées ou brachées, asymétriques et toutes diverses de forme. Du milieu de ces feuilles sortent des tiges nues jusqu'à leur partie où sont attachées trois feuilles quelquefois quinques, qui sont toutes de prédictes, et qui forment presque une bâche assez large au sommet aux angles qui sont embrassés, le bout de la tige contient une fleur à plusieurs pétales, dont la couleur varie suivant, et n'y a point de couleur bizarre qu'on ne trouve dans l'anémone, rien n'est plus charmant que le doux mélange des couleurs qu'on observe dans quelques unes de ces fleurs.

Cette plante est inodore ; elle pique le cœur, et attire les phlegmatis.



Anemone



Anemone jordanis

Arum maculatum, maculatum.

Candidum et nigricans:

Lied de Veau.

Cette plante possède de la racine de laquelle oblongues, larges, larges, triangulaires, larguées. Il s'élève d'entre elles une tige haute dans l'abîme, ronde, ramifiée, qui porte en son sommet une fleur à une feuille. Seule la coupe en l'assujettant, et toutes, pourraient dire en cornet. Quand la fleur est passée, il prend de la baie rouge, ressemblant comme en grappe dans le vase du pistole que fait au fond de la fleur, et qui se terminent par une espèce de filon : chacune de ces baies contient une ou deux semences presque rondes. La racine est tubéreuse, grosse comme de pouce, blanche ou jaunâtre, ébruyée,

La racine de cette plante s'herbe et mise en poudre, est connue dans l'apothicier, dans la Vieille France, dans les cordages dans la médecine, dans les fleurs et rameaux ; les feuilles jumelées, et appliquées sur les ulcères sur la bouche et des cheveux des moustiques au sein de l'ouïe.

Ried de Veau.



Arum maculatum L.

Anacampseros, Vulgo Tuba Crassa,
abarca, *Crassula minor*, *telephium*-
Vulgare:

Orpin, *Tere Grasse*

Cette plante croît à la hauteur d'un pied, cendre des Cigars tout
droit, roulés, solides, se vaut à maturité qui sortent, sortes de tiges.
En juillet naissent de longues tiges : elles sont en grand nombre,
puissantes, ramifiées, presque toutes pres de pourpier, de couleur
vertâtre, mûres quelques fois d'un peu de rouge, dressées au bout
verso, ses fleurs viennent aux Tiges et des branches, en
gras bouquets de presque un poing, de couleur blanche ou pourpre
chaque fleur est à l'ayant plusieurs disposées en rose. Ses feuilles
sont fort minces. Ses racines sont formées de plusieurs tubercles
étendus.

(Elle est astricte, emulsaire et detoxique).

Orpin



Sedum telephium L.

S. ecale hibernum vel majus.

Seigle :

D'ente qui à ou commencement des feuilles rongeant, mais
elles deviennent ensuite vertex comme celle de autre blé, plus longues
et plus étroites que celles du froment, elle pousse six ou sept tiges aux
quelques pieds d'intervalles. Semblable blé à ceux du froment, mais
plus longs, et plus grêles. Ses fleurs naissent aux commissures des
coupes par paquets, composés de plusieurs lanières jaunes, de rangées
de graines. Quant les fleurs sont passées, il laisse succéder des graines
oblongues, grêles de couleur brune en dehors, blanches et florissantes
en dedans. Les tiges des seigles sont plus longs, plus grêles, plus
grêles et plus aptes à geler que celles du froment, et deviennent plus
épaisse et fibreuse.

Sur quoi fait à faire du pain qui change plus que celui
des froments, ta pâie ou platé le pain fait ressortir tel appétit,
le pain fait rouge dans le four auquel appelle la soupe —
entre deux à l'usage du quartier la soupe ?

Seigle



Secale cereale.

C^o Ligrimona, C^o lise cupatorium Petrum
Ligremoine?

(Cette plante à feuilles râpées longues et étroites, et les tiges
fort courtes, avec feuilles de deux ou trois centimètres, quelquefois plus, brachiatées
et garnies des boutons, et quelques feuilles longues, étroites, allongées, sont à
dire, composées de plusieurs folioles, feuilles qui sont rangées, sur
une même tige, terminées par une saillie. La partie (folioles) qui est
sauvage a les bords relevés de plusieurs aiguilles qui pénètrent la
fleur et empêchent que d'autre poudre, bleuet, etc., ne pénètre.)
C'est une tige de deux ou trois centimètres, presque tout longueur
bien évidé. Les feuilles qui sont toutes, et ici, sont fines, terminées par
deux protubérances opposées en sorte que toutes les protubérances, et toutes
les feuilles qui devraient faire la saillie sur la partie oblongue, sont à grignotées
vers le milieu et qui rendent une sorte de dentelle ou un tissu de la sorte.

(Cette plante est apte à guérir toutes les maladies de
la poitrine.)

Aigremoine



Agrimonie eupatoria L.

C Bumula, ou Consolida Medic
C Buyle ou cinere moyenne?

a racine de cette plante est fibreuse, chevelue, astringente au gout, et donne des feuilles, semblables a la paquerette, mais plus larges, plus serrées. Son pied laisse une racine. Il croît sur les bords, et comme bénétier, du milieu de la rivière (meilleure) deux sortes de buches, une une. Sont portées sur fleur, les autres sont couchées, et le diamant que des feuilles voiles, semblables aux premières, peu lues, épaisses, plus petites, et disposées par paire dans l'espace, toutes. Celi sonnent lige, sonnent des piliers - ibex, qui portent des fleurs d'un mousseux. Les feuilles et fleurs a un myrrhe à l'epice : les tiges de fleur sont aussi garnies de quelques paire de feuilles, et terminées par un qui defluer en graine, bleue quelque fois de couleur de chêne, autrefois toutefois, ou caulee se retouillée : branche fleur est un hysseau - on y voit deux lieux environ, une en son bout et rebroussé en une branche decoupée en deux parties, la moyenne est quelque chose d'autre, la partie de la branche supérieure ou ordinairement occupée par deux petites branches qui est une grotte de deux lignes de long, blanche, volé, et renferme du sang pur, renferme dans le pied quatre petites semences presques rouges, soit fleur sont sonnent au gout et emploient dans une potion vive liquant navelage, la Buyle forte communement fait les entrailles fumidels, dont l'empereur et sans les boire :

Celle apporte dans les entrailles navelage, renferme plusieurs sortes de sels divers du foie, et provoqua l'empereur

Bugle, ou, Conygre, moyenne.



Ajuga pyramidalis L.

Valeriana palustris minor,
Thuminium:

Valérienne, ou Valeriane des marais
Petite valeriane

D'abord la racine est petite blanchâtre garnie de
filaments de ver bruns dressés, elle pousse des feuilles molles vertes
et quelque fois decoupées, les feuilles sont attirées à une côté sur
une tige rousse fine. Elle pousse dans les marais et pointe
du bout de ses feuilles d'abord une tige, bientôt l'ourion deux
pièces garnies de feuilles sur laquelle apparaissent semblables à
celle du bas au sommet des tiges il naît un bouquet de fleurs
jaunâtres oblique. Chaque fleur est une longue corolle en forme d'entonnoir
la longue partie il lui succéde une partie aplatie un peu longue
chargée d'une nigrette.

La racine est cordatacée jaunâtre propre pour l'hydropie
pour l'asthme.

Valérienne des Marais



Valeriana officinalis L.

Q) *Satyrion Primum, Cynosorchis*
Satypotia hiantis Cacullo Major, et
Cestrum Canum:

Satyrion:

Plante, qui est une espèce d'orchis, dont les feuilles sont longues, grasses, presque épaisses et étroites à celles de l'iris, et un peu luisantes. Ses tiges sont à la partie de plus d'un pied rugueuses et portant en sa sommité deux ou trois fleurs en grappe, et disposées en esp. de boutons rouges. Ses racines sont de proportions moyennes, rongées par le ver, et ces bulbes produisent au commencement de l'été des tiges assez courtes et toutes couvertes de feuilles oblongues.

Sa racine est préparée pour soins de la Vénus:

Saliryom f^r on festiculles de Chie.



Tropic latifolia V.

*& Tanacetum, Pargare Suleum,
Tunisie, ou Tunisie, ou Lannée,*

Plante haute de deux ou trois pieds. Ses tiges sont vides,
souples et épaisses; ses feuilles sont glabres, longues, étroites comme
des aiguilles, ayant des découpures de plusieurs parties, et divisées
en deux tout de couleurs verte-jaune. Ces fleurs naissent aux
extrémités des tiges, par groupes serrées de plusieurs, toutes
jaunes, dentelées, pointe hant-fine. Celle-ci est jaune vif
lissant, recouverte blanche. Son hôte est une plante
jaune des semences sauvages, à feuilles, qui naissent en plusieurs
racines et longues, avec emplois fibres qui
provoquent de l'odeur forte et dure. La plante a une
odeur forte et une gout amer.

Celle-ci est rougeâtre, vénitienne, par son naturel, hygroscopique
appréhensive, elle est bonne pour la caligine respiratoire, pour les
moustiques, pour les vapours, pour le vent et pour les vertus, tant
externement qu'intérieurement.



Tanesies, ou Tanaisie



Tanacetum vulgare !

Tulipa.

Tulipe.

Cette plante pour une tige ronde, aussi large que longue, et de quelque
taille, astre, l'angle, parer lequel portant en sa sommité
une petite fleur à six pétales peu exsert, et dont la corolle est souvent
plus large que l'ouverture grande, ouverte de toutes costes, jaune
ou pucepoisie ou rouge, ou blanche ou variée, lorsque cette fleur
est fraîche, il paraît toute en fruit oblong, relevé de trois lobes, et
d'usage en tout temps remplie de semences fort appétentes. Sa
racine est un gros rhizome jaunâtre ou noirâtre, couvert de
plusieurs tuniques qui se déboulent sur une sorte de racines, garnies
de fibres douces. La partie la plus élevée:

Tulippe.



Tulipa gesneriana L.

Aquilegia vulgaris major.

Armoise : herbe de la fée Jean.

Cette plante a la racine grosse comme le doigt, blanchâtre, et bruyante, un peu douce et aromatique au goût. de son collet naissent plusieurs tiges fines de quatre à cinq pieds au plus. Canelees, velues ou veloutées, moins grosses que le petit doigt, le plus souvent lavées de poussière, sauf celles qui sont garnies de feuilles, qu'elles soient plates ou blanchâtres, assez semblables à celles de l'absinthe ordinaire, mais leur Ségur fait plus large sous le bas, et plie longuement vers la pointe à deux branches, elles sont toutes cette sorte en dessous et blanchâtres en dessus. Ses tiges sont toutes blanchâtres et terminées par des grappes de fleurs, ce que l'on voit au bout de petites feuilles de nature de poussière ou de blanchâtre, et renfermées dans les collets, ou leurs extrémités, une ligne de diamètre ou environ. Ces fleurs ont une odeur forte aromatique, et peuvent agreeable et appréciable de celle de la lavande. Leur parfum fort vivant comme celle de l'absinthe, est suulent aux fleurs.

Cette plante est renommée des grosses et malades de la femme, ou l'empirie ou décoration et aujourny.

Airmoise



Artemisia vulgaris L.

Myagrum Sativum (Pseudomyagrum)
Myagrum Batard:

Plante dont les feuilles sont oblongues, semblables au genou, manier à celle du pastel cultivé, mais la plus part sont laineuses embrassant le long pied des tiges, qui est la partie la plus longue de toutes les tiges, et fleurs sont petites et grises feuilles, disposées en deux rangs. Le feuille des pieds sont formés en petites poches renouvelées, qui contiennent l'eau et par où il sort une sorte de sauge blanche, et multatzo.

On voit de la semence de cette plante par rapport aux feuilles qui est propre pour assouvir la soif de la peau :)

Myagrum Batard*Thlaspi alpestre* L.

M^o
Nasturtium (Aquaticum & Minus)
Nasturtium aquaticum Alterum
Cresson De Marais:

Plante qui a plusieurs tiges de filaments roulés et branlantes sur
lesquelles sont presque toutes des ailes de la plante une ligne de l'autre à une
grande queue (comme pour une feuille) plus large que les autres, et
qui est tigre ou curieuse en pied d'autour le long de quelle sont des
feuilles alternes et courtes. Decoupe par la sommet de la tige dans
les fleurs blanches en deux sortes une grosse, et une autre
plus petite qui sont toutes toutes loges :

Cette plante est apportante et bonne pour l'escrobi :

Cresson de Marais.



Cardamine matrovicola L.

Q
L'guisetum majus vel palustre
Queue de Cheval ou prête des Brez;

L'autre qui poussent est tige à la hauteur d'un pied et moy va de deux pieds, rudes, rudes, rudes poussent. Chaque Nogent est une tige comme un petit talon de fer. Telle tige au dessus et que l'enfonce aisement en arrière, telle tige au bout une racine. Composée de plusieurs tiges unies ensemble bout à bout. La fleur fait les graines fort corset, chargées d'une sève sucree au champignon. Telle tige a plusieurs rameaux qui portent une colonne roulée vers le milieu : mais elle ne porte aucune fleurance avec elle. Les femmes viennent les surprendre que reportent point de fleurs et font des graines. Voilà ce qu'il faut faire, souffrir. Telle tige n'est pas :

Cette plante en fait naturellement fort attirante : on ordonne sa succion dans le diafragma de l'utérus pour les éliminer des hémorroïdes ou des moxas.

Quieue de Cheval, ou prêle des Prés



Equisetum palustre!

Picea Silvestris.
Logette Sauvage.

Plante. dont les premières feuilles ressemblent à celles de la vare-
mit plus petite elle passe des tiges à la hauteur d'un pied ou
moins, les feuilles qui naissent le long de la tige, sont à lame
et entièrement dépourvues de floraison qui naît soit au bout des
tiges soit à moitié feuille dépassant en biais, de couleur fraîche
comme sur le blane, rase à la base, toutefois pas de lobe ou de
petite branche de quelque logette que ce soit née sur lobe
ou pétiole de quelque tige ou presque toutes condensées, jaune. Sa
racine est mince lugueuse, blanche.

Elle subtilise certaines chasses le bout et prolongé
l'arête.

Sur cette les rameaux de Picea et de
Logette Sauvage n'a constamment une
racine fort différente

Rigquette. Sauvage.



Reseda lutea L.
herbe jaune

Canonecum Silvestris
Renoncule des Champs pied de Sou

Plante que la racine est blanchee fibreuse qui a lez
feuilles luisantes arrester du pordil mais beaucoup plus grandes
elle pousse de la racine des tiges molles roses branchees ramassees
par feuilles pour attacher et n'ont pas blanchie dans quelque conteneur
aillors des feuilles, les fleurs sont composées de 5 petioles
rouges avec 5 lames 2 ou 3 lames et une autre inférieure
formant un pompon de la même couleur elles sont toutes roses
fleurir decouvre très promptement en luy gardant

cette plante est une grande racineuse) elles couvrent
et valent avec grande force , elles germent tellement lez
graines et les racines , il fait assez bonne partie d'apres
long tems les feuilles ou les tiges , feuilles parue sur lez
appartements :

Renoncule 1^{er}

Renoncules rapiens L.
f. cicutellata

Leucoium Bulbosum Vulgar)
Narcissus Albus magno odore)
8 *Tore Cœruleo pallido.*
Narcisse. Blanc.

(toute qui pousse de sa racine des feuilles presque
invisibles à l'œil du printemps de couleur verte et plates, et
fête d'entre elles une large à la pointe de pieds portant
en sa sommité une grande fleur, à une telle hauteur que
lorsqu'il s'ouvre deux ou trois fois, il se trouve dans le rang de ses
feuilles qu'il est presque à l'horizontal. Il sortent de cette
fleur, sur le bout incurveable parmi une autre pièce, elle est
d'une couleur fort agréable, lorsque la fleur est passée, il lui
reste une partie assez gros (triangulaire), divisée en trois longs
renflements de couleur verte presque toutes. Sa racine est
bulbeuse :)

(la fleur de Narcisse est une grande ovaire presque)
en étages (triangulaire)

Narcisses.



Narcissus poeticus /

Orechia Latisfolia præmorsa, revoluta,
^{Canae} Satiatione. 2^o

(ces plantes n'en diffèrent de celle de la page 152, que
par les feuilles qui sont plus courtes & plus larges. Dans celle
qui que dans l'autre:

Safiryum, ii^e

Orba Domestica Pot Câine
Cormier, ou Chorbier

Le Cormier est un petit arbre, fruitier, de la moyenne grandeur d'autant plus fort le tronc en basse étoit, couvert d'une ciree rude et brune; ses branches se tendent vers l'assez rapidement vers la tige, dont l'écorce rouge piquante est garnie de feuilles, dont plusieurs paraissent être des aiguilles; ces feuilles sont composées d'un nombre de folioles, longues et pointues serrées en deux branches au dehors, s'étendant assez profondément par les bords renversés par graine sur une nervure commune, terminée par une foliole unique, elle fait phare alternativement sur les branches, non aperçoir des stipules à leur insertion; il n'est pas fleuri en une grappe blanche composée de longs très petites et pointues lanières, ou un petit bouquet se change au bout d'une grosse fine poire, et tout à l'heure brûlé par la chaleur, sans dégager de saveur forte, mais une saveur forte et aigre, et cette saveur est très rouge par dessus. Il aces que gout, et non bon à mangier que lorsqu'il est comme pour?

Navel



Brassica Nares

Valeria Campestri, inodora, major,

Matthei.

Cette plante à une racine ronde, fibreuse; son goût est peu doux et presque insipide, doux, bête, plastique, & lèger, d'angle égale, manuelle, rameuse, & qui n'a pas de diviseur; les deux branches à chaque nœud. Ses feuilles sont oblongues, étendues, détaillées, de couleur d'herbe. Ses queues de racine sont plus que la racine. Entre les feuilles qui sont très serrées, des branches naissent des petites fleurs assez belles, blanches ou griseâtres, dépourvues d'angulation. Ses feuilles sont toutes un peu aplaties. Blanchâtre.

Cette plante est un peu laxative; on la mange ordinairement en salade.

Mâches, ou Cleriettes.



Valeriana locusta!

Aparine bulgarie Gratelon, ou Reble.

Plante qui donne une petite racine poussée plusieurs tiges
coriace, rudes au toucher nullement jolies, s'attachant aux corps
voisins, branched, longue de trois ou quatre pieds. Ses feuilles
sont longuette, étroites velues, au nombre de sept disposées au
demi des rameaux des tiges en forme d'étoiles comme celles de la
girasole. Ses fleurs sont fort petites, blanches, souvent chauves
en quatre parties. Lorsqu'elles sont grossies, il vient un fruit qui
a deux graines presque égales et attachées ensemble un peu larges
vers le milieu. Couverte d'une peau noire et hérissée et remplie d'une
pulpe blanche;

L'eau distillée de cette plante est bonne pour les malades
de poitrine et pour les vapours : quelquefois la joint boire
dans la grippe.


Gratteron.



1. *Galium aparine*!
2. *Galium mollugo*! *Caillebit blanc*.

O nobrichet. foliar, viciae fructus
Ceratato major :

O Lainsoin.

^{N 38} 
Plante qui pousse des tiges longues de deux pieds environ,
composées de feuilles à deux et trois folioles ou feuilles plates à deux
ou le tiers, bordées de dents - blanchies et veloutées par dessous, poussées
alternativement par paquets. Fleurs toutes terminées, petites feuilles (fouette),
et fleur toute terminée (fouette). Différente en ce que long et large
je troue la forme de poire ou pomme : branche en étoile de 3 ou 4 branches
de pousses nées reniformes (bacules) une terminée qui a la figure
d'un pot en fer, et l'autre est longue et étendue qui est une
sorte blanche ou verdâtre.

C'est un bonne graine pour la croissance des bestiaux :

Sainfoin.



Medicago sativa L.

Helleborus Niger, Solidum.
Pied de Chiffon:

Plante dont la tige, rouver la hauteur d'un pied et un peu plus,
est garnie jusqu'au bout d'une partie de feuilles de laissées
épanouies, décomposées en moins ou en plus, la tige est droite, l'ensemble
des feuilles, et les tiges sont toutes droites, mais l'ensemble
des feuilles de la tige sont toutes droites, et toutes les feuilles
sont longues, et toutes droites, et toutes droites que les feuilles qui sont
en moins nombreuses de la tige, sont toutes droites, et toutes droites
toutes les feuilles sont toutes droites, et toutes droites, et toutes droites
l'ensemble des feuilles de la tige sont toutes droites, et toutes droites
la tige est droite, et toutes droites, et toutes droites, et toutes droites
l'ensemble des feuilles de la tige sont toutes droites, et toutes droites
l'ensemble des feuilles de la tige sont toutes droites, et toutes droites.

C'est une plante dont la tige est droite, et toutes droites
des feuilles sont toutes droites, et toutes droites, et toutes droites
et toutes droites, et toutes droites, et toutes droites, et toutes droites
et toutes droites, et toutes droites, et toutes droites, et toutes droites.

Pied. de Griffon; eleborastrum



ellipticus foliis l.

Cruciate Croisette

Cette plante à feuilles minces, lancéolées, et poussant
plaques, tiges grêles, velues, garnies à l'apex de lames fines
grasses foliacées, est posée en touffes. Comme ailleurs, elles sont
appelées croisettes, nusseaux, ou fœufs qui forment comme des
moustaches. Ces lames sur leur face postérieure, garnies de
petites saupiettes grises ou d'aspicules. Le calice qui les soutient
serait un fruit composé de deux brins petits, lisses et roulés et
appelés l'une autre chose :

(On voit cette plante au nombre des cruciates et
estrangeantes !)

Croisette *velue*

Valance



Valantia cruciata L.

(P)
Cronica. Ch. d'Europe
Cronique herbe aux lardes

Cette plante pousse des tiges droites roulées, velues et rugueuses
les feuilles sont étroitement disposées l'une à l'autre le long de la tige, velues
d'abord sur les bords, puis dénudées à l'aise du pétiole. Ses feuilles sont
et aiguës, les fleurs sont des corymbes de quatre ou cinq.
fleur, elle sortent en mai et juin. L'épilé des feuilles est juteux.
Lorsque ces fleurs sont passées, il laisse suivre un fruit
portant enduit bouillant qui contient une huile suinte et forte
miracule.

Cette plante est vulneraire, diurétique, propre pour guérir
les foyers, pour débarrasser le poumon d'humeur de morteau, glandes
et pour les maladies de la peau, on sert à la maniere du thé.

the D'Urso 149.

Veronique ou Vellevote



Veronica Caeruleum L.

Cynoglossum major Vulgaris.

Cynoglossus langue de chien:

Cette Plante a des feuilles longues, courtes, pointues, lanciniées, molles blanchâtres, les fleurs sont finement étoilées de l'odeur de la myrrhe et contiennent une huile purpuree, son fruit à quatre lèvres est fermé se dévoile également qui contient un zibith; Chaque capsule contient une semence, sa racine est longue grosse ronde en dehors, blanche en dedans:

Cette plante est insipide, rafraîchissante, adoucissante.

Cynoglosse, ou Sangue de Chien.



Cynoglossum officinale L.

Fumaria

Fumeterre.

Les racines de cette plante sont minces et fibrouses, les feuilles sont longues et étendues comme des gouttes de pluie sur la graine. Elles sont vertes, serrées et ressemblent étrangement aux tiges. Les fleurs sont rares et sont en forme de petits pompons, pourpres ou bleus, collés tout quelque apparence des fleurs d'Asperges. La fleur bleue n'est pas pourpre que de deux feuilles qui garnissent une moitié de graine à deux macheires. La macheire supérieure est en dentelle par une grille. La macheire inférieure est ornée avec elle dans l'autre où l'une est triste. Cependant au pied de la plante il y a deux dents. Ces deux macheires le grès et sucre de la graine, ouvertes par la hache ou l'ail à la bouche de celle-ci. Celle la hache, qui est une espèce d'osmane que l'on sépare assez évidemment en deux poches qui prennent leur origine de la partie latérale de la macheire supérieure, c'est lorsque cette hache est grasse le grès est devant une capsule membraneuse, ronde, ou oblongue, dans laquelle se trouve une ou deux graines.

Cette plante est dure comme roche pour parer le fer et défoncer le pierre ; elle est forte que deux tonnes de macheire de la graine, dans la macheire il y a dans l'hydroxyde.

Fumeterre.



fumaria officinalis l.

Napier, C. Mural,
Naret, Narcole:

Cette plante ne differe de la ratre que par un certain point. —
elle possede une tige qui monte à la hauteur d'un pied et demi, ou de
plusieurs, tel qu'au bout, ou oblongue, decouper,
vers la racine, par deux et à quatre millimètres environ de l'oeil de la
tige forme et lui donne une lèvre longue divisée en deux
nages roulés de lèvres presque rondes, assez grosses, de
couleur rougeâtre, sa racine est allongée, ronde charnue, le plus
souvent blanche, et quelquefois jaune.

Sa lèvre est préparée pour la prémisse; pour la postérieure,
sa racine est comme dans la tige (au bout l'astuce, dans la partie)
c'est l'autre : auquel de grande similitude, ou pourtant les
chardonnacées, et plusieurs autres végétaux avec la Léonie de Navarre.



Cormier ou Sorbier;

Sorbus domestica L.

✓ 1790-1800 - L'apprécie
Tourbonnais.

— Poète, je t'aime dans les jardins qui me semblent
en tout à la Tourbonnais ! J'aime et j'apprécie que les fleurs soient unies
en Rose double et Couleur purpurine. Obeyez ! Je ne suis pas
de plusieurs goûts. Je n'apprécie pas les fleurs, j'apprécie les tiges de leurs longueurs
et l'harmonie des couleurs. Je n'apprécie pas les portées ; cette fleur est
avulée de toute forme !

La Bourbonnaise.



Euphorbia corollata var. purpurea. L.

Nicaeia Lepidum (folio Rotundiorum)
acuto.

Vesse, sauvage.

(elle pousse à les Sautilles comme la Vesce, mais plus minces et plus longues; la tige est quadrangulaire, les feuilles sont engagées), soit plusieurs fois plus court que leur plus longues que celle de l'argentier, et plus grande que celle des Sautilles; la graine est noire, et un peu plus grosse que celle de la Vesce :

Sa racine est sucree, de saveur terrestre, abîmerveilleante; elle est de sauvage digestion pour le foie, offrant quelle soit donnee avec les poisons; elle arrête le devoilement d'étonnante efficacité sur les fistules et les tumeurs de la peau.

Vesse. Sauvage.



Vicia cracca L.

Lobelia Vulgaris.

Lobelia

Plante qui porte plusieurs petites tiges à la base de plusieurs
petits pieds roulés de poils rouges & alternativement sur
mes oblongues & pointues (en arête arrondie). Ses feuilles sont
petites disposées en manche d'épée. De couleur bleue ou verte
ou pourpre. Ses fleurs sont bleuâtres, blanches, blanches
couvertes dans le fond de rouge gras le haut en dessous bleue. lorsque
elle fleurit est rouge il lui donne un gout au bouche agréable.
Divisée en deux loges compléte de pousses oblongues, la couverte
intérieure, avec le rouge.

(Celle plante porte des feuilles et une autre partie)
petites.

Polygala*Polygala amara L.*

*C*anoneulus *Palustris*
Renoncule 2^e Specie.

Cette plante a une racine blanche et fibreuse, ses feuilles se dirigent en croix à chaque partie est dressé vers le bas obliquement contre le drap par lequel il pointe, cette poussée de l'herbe quelques fois à la surface de l'eau ou trois pieds garnie de feuilles qui naissent dans la séparation de la branche ainsi que les fleurs qui sont toutes blanches. Composée de six pétales, et plusieurs étamines de la même couleur.

C'est une plante que l'on dit qu'elle occire le rince jardinière. C'est à dire que ceux qui en mangent meurt avec une constipation de nerf qui trouble les faire rire.



Renonculeæ



Ipomoea, Hemerocallis, Lilium
Convallaria, Album.

*Huguet Lis de la
Vallée.*

Le rhizome grossier de trois ou quatre oblongues roses
angulaires semblables à celles du lis mais plus petites. Ses fleurs
sont presque toutes, ayant la figure d'une étoile dénudée et n'ayant
ou très peu d'éperon, blanche cette d'une odeur agréable. Il a des feuilles
de la taille presque toutes rondes qui ressemblent plusieurs semaines
avant à celles d'un campanier luisante.

Les racines du Huguet sont aplaties, propres pour la
parasitie, pour le rouge, pour l'épilope, ou tout aussi jolies
pour la came pour faire l'encens.

Anguete



Gaultheria macrostachys L.

P... II

Læonia folio nigricante
Spendido, qua mal.

Plante qui grappe des liseres abatuees de deux ou trois pieds,
tiges et quelque rameaux. Les feuilles sont nombreuses a celer
les noyaux, sont plus larges et plus greves, vertes-brunies luisantes
couvertes d'une sorte d'huile qui les anime. Ces fleurs sont grandes
rouges a plusieurs feuilles, disposées en rosette, de couleur quelquefois
violettes et quelquefois chamoisette; l'ouverture par un centre a long
feuille, lorsque la fleur est grappée, il lui manque un pied
composé de plusieurs lames, oblongues, dépourvues de tout, renversées
en bas et qui s'inclinent sur le sommet, laissant voir de
luminosité presque éperdue: rouge au commencement ensuite bleu
obscur, puis noir, les tiges sont brunes et roulées en nœuds
grosses comme l'ongle, de couleur rougeâtre aux bords, blanche
au milieu:

La fleur est la lumineuse qui fait un asperge, n medicina
pour les maladies de l'oreille, comme pour l'appétit pour
l'ingesta, pour la paralysie:

Rivoine Mâle



Rivoine officinalis L.

(*Chrysanthemum Salsum Cerefolium*)
Cerfeuil:

Lente potagere, dont la racine est blanche, grosse comme
la petit doigt a la collet, lorsque cuoye être au goût, et que
l'ouïe des jardins leudre, plus souvent decouper que de peler
un peu velue, une herbe plus gâté, il n'est pas bon, et il a pour arôme quelque
de l'herbe Cerfeuil forte que ou plusieurs tiges faillies de deux pieds
au plus minces, cueillies, coupé, lissé, voilé, disposer en
espace, disposer en quelque branchez qui d'abord naissent alternativement
des aisselles des feuilles, mais qui sont opposées aussi bien que les
feuilles en appositions du haut. Elles portent des poils
subtilles blanches compoëes de (vingt) petites parties régulières fines
et disposées en maniere de fleur de lys de France, a
ces fleurs s'endent des poils longs de deux pouces. Les deux
tiges minimes de largesse, faites en maniere de bec d'oiseau, tiges
et glabres, compoëes de deux sommets aplatis (pour l'abondance)
quelles se jointent l'une a l'autre. Leur odore et leur goût
est doux et aromatique;

On cultive le cerfeuil parmi les herbes potagères, pour servir
le goût de celle qui sont un peu fâche; les feuilles sont employées
dans les bouillons apéritifs et rafraîchissants, l'eau de miel
particulierement en provoquant les urines, et lorsqu'elles sont
cuites sont aussi apéritives et digestives;

Cerfeuil

*Cheropogon criploides* l.

Cithymates Leptophyllas
Cithymale. 6^e Specie.

Toute la tige qui pousse des tiges à la hauteur d'un pied et plus
formé tout autour de cette longueur et moins de la moitié de celle-ci
aussi à son extrémité plusieurs branches chargées de racines
de toutes sortes de tiges il pousse des feuilles toutes égales
que l'on voit sur deux ou trois de portant de diverses sortes de feuilles
qui ont l'air de toutes les fleurs sont d'un vert grisâtre garnies
de petites taches rouges.

Celle à ses qualités telles que Cithymale

Tithymale Leptophyllum



Euphorbia curvata

Laxifraga rotundifolia alba
Laxifrage. Lierre. Lierre

Plante qui pousse de la saule, presque ronde, dont les feuilles
immatables et celles du hiver sont toutes grasses et blanches. D'entre elles
sortent deux ou trois tiges a la hauteur d'un pied qui portent en leur sommet
de petites fleurs a cinq boutons disposées en rosette de couleur blanche.
en fait d'elles presque rondes. C'est une espèce terminale par deux lobes.
et sortant de deux lobes, et complétant le cercle. C'est aussi
d'une jette plusieurs fleurs, au haut de quelques feuilles bleues
de petite taille que sont comme des graines de force ou de goutteux en
leur pourpre rougeâtre, ou vertâtre blanche.

Cette plante pousse généralement dans les
coteaux de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, ou dans les
feuilles de la saule communale.

Saxifrage



aprifolium, *Perichinenum*,
erictinum: *Lilium julie spinar*)
(crepueille).

Le bristane dont la racine est lignante, ressapante, et
couve a son étoile plusieurs petits hippocampes, Gros sommeil des plantes
a l'oreille, couvert d'ongles gris ou mous, devant le coeur dont
l'ongle il se trouve, l'anthé de partance en partie, et en partie de
part, Toutes lorsque il se met, que l'ongle de quelque corps
auquel il prêteront favoritement pour les tortures, de quelques fibres
et un fil, qui sont toutes brûlantes, mais tout de suite -
opposé au toucher mollet, l'un tout gris au dessus, plus gris au
pied velours au dessous, et entouré de brouiller, tout entier de
fibre d'osseux en coupole chaque fleur est en tige. Sonne parfois
bien assez forte heurt et résonne en deux lames. Dont la première
est recouverte en quelque partie des beaux plus grande ordinairement
que la dernière, qui est couverte le plus souvent en minceur de
languette. Le talon qui soutient la fleur n'a pas une fibre molle
d'un rouge cirant sur le jaune, grosse comme un poing, d'un gros
squelette elle renferme quelque semence dans appartenir et
griffe ovale. Observez que la dernière partie du bout de la
tige vers la fleur soit renversée une partie l'ouverte l'autre
ferme la tige, pour qu'il est aussi nomme perfoliate.

Le feuille est un pétant à deux tiges, et propres pour
la naissance, une des tiges roulé dans l'autre et dans la tige.
sur la surface une tige difficile qui fortifie le bord, et feuille
nacchentement :

Chevrefeuil



LONICERA XYLOSTEUM

Aquilegia, Aguilina; Ancolie. Colombine, Gauds.

Santé dont la racine est l'ivore, blanche dans au goût, bramehée
grise à son éclat d'ivoire ou gris. Ses feuilles sont portées par des
petites tiges et sont bruyantes; chaque feuille est trois branched'ordre
tenuance, portant au bout une petite pétale, qui portent à leur extrémité
des feuilles larges d'un pouce environ, oblongues, charnues et septurées
en trois, de couleur noirâtre bord, elles sont d'abord d'un vert assez
gai, qui brune ensuite et devient plus foncé quand elles sont à boutouys
dans la plante et dessèche. Les tiges qui relèvent l'ivoire et feuilles
sont assez minces, quelquefois étroitement combinées, et toutes de
trois à quatorze pieds de hauteur. Lequel qui diminuent dans
leur volume. Il n'y a guelle apparence de l'extrémité des tiges.
Les branches portent des fleurs à plusieurs pétales. Dont les deux
sont rouges intérieures, et les autres sont grisâtres. La substance de
ces fleurs varie beaucoup; l'arrangement est le même des pétales
de ces fleurs ne sont pas constants; on en trouve sous les fleurs
sous à cinq rayons en manière d'étoile, le plus ordinaire pour nous devant
un petit empêche de plusieurs grande fleur bleue sauvage, d'un peu
environ et qui renferme des pétales toutes rouges ou grisâtres;
noires et lugubres.

La racine est apoprotive, bonne pour les jaunissez, et
anti-corrosives.

Ancolis

Aquilegia vulgaris L. Matthioli.

Orobanche Major (uryophyllum)
etend :
Orobanche)

Paste qui pousse une tige jaune. Comme à la hauteur d'environs
un Pied, brisée, ronde, elle ne s'ouvre point. Je l'ouvrirai plus. Je l'ouvrirai plus.
mais de l'ouverture de la fleur, croist, longs, et que se
relèvent fort en peu de temps. Ses fleurs naissent le long de la
graine à l'extrémité de la tige; un peu distantes les une des autres,
et une par une ouvrent toutes ensemble. Chaque fleur est un
cœur formé dans le fond, ouvert par l'autre bout; rouge et
jaune en marge d'une moitié rosée que, sur l'autre, l'autre
partie échappe. La racine est bâtie en caillasse d'un
genre extrême à amer :

Cette plante est très bonne dans les affections d'yeux et d'yeux.

Orobanchie



Orobanche major L.



*Table des Plantes contenues
du premier volume:*

A

Adance	3.
Agrostome	65
Aigronaine	103.
Alliaire	118.
Ancis	12.
Alexaige	13.
Amassante dure	14.
Amassante.	15.
Ancolie	188.
Antenne.	198.
Argemone	20.
Assoufie	21.
Avache des Jardins	22.
Avache Sauvage	23.
Avélaque, ou arbutique	24.
Asperge	25.
Aspergulaire	26.
Asperge	27.
Balsamine	28.
Barbe de Jupiter	29.
Bâton d'or	30.
Bea de grue, ou de l'ignave	31.
Bacabonga	32.
Balle de Nuit.	33.
Balsaisie.	34.
Bled Noir	35.

B.

Balsamine	5.
Barbe de Jupiter	36.
Bâton d'or	37.
Bea de grue, ou de l'ignave	38.
Bacabonga	39.
Balle de Nuit.	40.
Balsaisie.	41.
Bled Noir	42.

Bœuf Thame	43.
Bouillon Bleu	44.
Bourrache ou Bourrache	45.
Bourse à Léon	46.
Bouboumouette.	47.
Brays de la	48.
Bresson	49.
Bugle	50.
Buglose	51.

C.

Camomille - adulte	52.
camomille romaine	53.
Capitaine	54.
Catouine	55.
Casse - huile	56.
Catade	57.
Cœrule	58.
Cannet	59.
Cardon à cardes	60.
cardon cardé	61.
c'hasseldraive	62.
Chelidoine grande	63.
Chelidome petite	64.
Chenopoul	65.
Chêneau à aigrette	66.
Chêneau Ligament	67.
Cique;	68.
Couquelle	69.
Cocochlearia	70.
Coucou moyenne	71.
Coumar	72.
Couquette	73.
Cordyphale	74.

Coume de Goy

Couleurrie

Cresson de merveille

Cristelle

Croix de Jezusalem

Curage

Cynoglosse

D

Dent de lion

E

Éclaire

Élatine

Éternelle de Sainne

Éufraise

Éupatierre

H

Finiuel

Fosse de Coctou

Fève grasse

Fleu de Kure

Follelle

Fougere de chêne

Frailloue

Fraisidu

Franster

G

Gante

Gaudie

Germaniacee Jaine

78.	Giroflée Saine	
6.	Gratetou	192
122.	Granat	140
148.	Guinouiere	11
23.		43
46.		
150.		

H

Baricel

Belotropie

herbe à la goutte

herbe à l'Gravier grande

herbe à l'Gravier petite

herbe aux aulx

herbe aux Chab

herbe aux Chaypionnes

herbe aux Coctoues

herbe aux Cuilleret

herbe de la St Jean

herbe de la Craviet

herbe au hage

herbe aux Guex

herbe jaune

herbe aux Ladren

herbe aux Mâtar

herbe aux oïes

herbe aux grêles

herbe aux Pierrier

herbe aux yeux

herbe militaire

herbe Robert

herbaïce horniolle

houblon

Hyacinte

162.		59
72.		1
12.		32
		112

J

?

Sacate	112.
Jallage	52.
Indienne fleur	7.

L

Nacon	27.
Ladone	27.
Sangue de Boeuf	28.
Sangue de Coq	29.
Sangue de Chien	30.
Siree corsette	12.
Siree	17.
Sise des Vallées	18.
Sisonion Blanc ou de Virginie	64.
Lymnaea 2. Grecce.	62.

M.

Mâche	166.
Marguerite	119.
Marguerite grande	17.
Mayolisme	29.
Minouette	72.
Mimule Blanche	21.
Mirabe Noir, ou juvante	47.
Mirabe petite grecce	70.
Mirabe	12.
Moustache aquatique	68.
Mercure. Semelle	16.
Meronial male	18.

Mervail du Poivre

12.

Miel grainé

1.

Miel ou Mellek

19.

Miel fraîche

59.

Merville

26.

Muron semelle

100.

Mousse corsette

66.

Muguet

150.

Muguet-Balard

196.

N

Narcisse

146.

Narcis. ou Narcissus

143.

Nastur. des Indes

49.

Nastur. des Soudans

85.

Noix matelle

83.

O

Oillet de la chine

26.

Oillet. Sauvage

18.

Oillet. Ojoli

40.

Oaille. O'One

82.

Oaille de Rat

100.

Orebauche

166.

Osein

127.

Orée Commune ou grande. orée

24.

Orée Grise. ou grisele. orée

52.

P

Palais de Poire

27.

Laurier

96.

Laguelle	
Fabinière	119
Lasse - Taw	87.
Lasse Velouté	125.
Lamelle	40.
Lenticulaire	16.
Lérotte, feuille	56
Lérotte, pierre	90.
Lérotte pierre	182.
Lérotte pierre	314.
Lérotte de Couleau	
Lied de Griffon	77.
Lied de Lou	147.
Lied de Rose	160.
Lied de Rose	126.
Litsch	100.
Linyroenne	124.
Lissatik	98.
Louve mâle	158.
Louvina à long dos	2.
Louvina à long dos	2.
Louvina aquatique	92.
Louver aquatique	46.
Lourde	85.
Lophode de Chevre au feuille des frêres	110.
Lophode	181.
Lophotie	65.
Polygala	188.
Primula ligustrinum	80.
Potentille	114.
Lourde	
Prête aux frêres	74.
Primula	128.
Primula	118.

Q.
Quée de cheval
Quette feuille

R.

Reble	
Rogisse	167
Renoncule p. ^{re} et 2 ^e	116
Rême marguerite	116
Renouée	116
Rognette Sauvage	1
Rue des maraîchers	129

S.

Sainfoin	
Saponaïce	166
Sarriette	11.
Sarrazin	7
Salyrium 1 ^e et 2 ^e	116
Saronnée	11.
Sauve-vie	11.
Saxifrage	116.
Scabieuse	21.
Scalognarde	11.
Scorzonaire	16.
Scrofulaire petite	16.
Scrofulaire	16.
Sesupe	116.
Sesame	11.
Sesypia O. Capryne	11.

<i>Syprine</i>	86
<i>Sypholæt</i>	87
<i>Sorbier</i>	102.
<i>Soucy de marais.</i>	117.

S T

<i>Salouïe.</i>	4
<i>Canarie.</i>	122.
<i>Castilleches de Chine.</i>	$\left\{ \begin{array}{l} 123. \\ 124. \end{array} \right.$
<i>Caucas.</i>	127.
<i>Chenette.</i>	128.
<i>Athymale</i>	$\left\{ \begin{array}{l} 129. \\ 130. \\ 131. \end{array} \right.$
<i>Commeot</i>	132.
<i>Lalipe.</i>	134.
<i>Lorgnette.</i>	1.

V

<i>Véronique des marais.</i>	135.
<i>Véronette.</i>	$\left\{ \begin{array}{l} 139. \\ 140. \end{array} \right.$
<i>Véronique malte.</i>	141.
<i>Véronique.</i>	142.
<i>Vétoe.</i>	143.
<i>Vétoe Sauvage.</i>	144.
<i>Viquotte.</i>	14.
<i>Viollette de marais.</i>	145.
<i>Viole.</i>	146.

Y

<i>Yyc. Malicata.</i>	12.
-----------------------	-----